

เต่าร้าง



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Caryota bacsonensis* Magalon

ชื่อสามัญ Jaggery palm, Toddy palm, Wine palm, Fish-tail palm

ชื่อพื้นเมือง ตาว (นครราชสีมา); เชื่องหลวง (ภาคเหนือ); จอย (แม่ฮ่องสอน); เต่าร้าง (ภาคกลาง, ภาคใต้)

ชื่อวงศ์ PALMAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ต้น เต่าร้างเป็นไม้จำพวกปาล์ม มักขึ้นเป็นกอจากการแตกหน่อที่โคนต้น ลำต้นตั้งตรงสูงชะลูด มีกาบหุ้มลำต้น เปลือกต้นสีเขียวเทา

ใบ ใบประกอบแบบขนนกสองชั้น ใบย่อยรูปพัดปลายใบเป็นแฉกแบบหางปลา

ดอก ดอกเป็นดอกช่อขนาดใหญ่ เกิดตามด้านข้างของลำต้น ดอกมีขนาดเล็ก สีขาวครีม

ผล ผลกลม สีเขียวแกมเหลือง แก่จัดสีน้ำตาลเข้มเกือบดำ มี 1 เมล็ด

แหล่งที่พบ ป่าดิบแล้ง

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ชอบแสงแดดรำไร ขึ้นได้ดีในดินแทบทุกชนิด

ฤดูกาลใช้ประโยชน์ ตลอดปี

ส่วนที่ใช้เป็นอาหารอาหาร ยอดอ่อน คล้ายมะพร้าว หั่นเป็นแว่น นำมาแกงส้ม แกงกะทิ แกงเลียง

รส มัน หวาน

การขยายพันธุ์ เพาะเมล็ด แยกหน่อ