


เสี้ยวใหญ่



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Bauhinia malabarica* Roxb.

ชื่อพื้นเมือง เสี้ยวส้ม (นครราชสีมา); คังโค (สุพรรณบุรี); แดงโค (สระบุรี); ปาม (ส่วย – สุรินทร์); ส้มเสี้ยว (ภาคเหนือ); เสี้ยวใหญ่ (ปราจีนบุรี)

ชื่อวงศ์ LEGUMINOSAE – CAESALPINIOIDEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ต้น เสี้ยวใหญ่เป็นไม้ต้นขนาดกลาง สูงถึง 15 เมตร เปลือกต้นสีเทาเปลือกแตกเป็นสะเก็ดยาวตามลำต้น

ใบ ใบเดี่ยว เรียงสลับ ปลายใบหยักเว้าเป็น 2 พู ผิวเรียบ ท้องใบมีนวลสีเขียวออกเทา

ดอก ดอกออกเป็นช่อ ตามซอกใบ สีขาวหรือเหลืองอ่อน เป็นช่อเล็กๆ ออกดอกเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน

ผล ผลเป็นฝัก แบนยาว โค้งงอ ฝักอ่อนสีเขียว ฝักแก่แห้งสีน้ำตาล เมล็ดแบนผิวเรียบ เป็นมัน มีเมล็ด 10 – 30 เมล็ด ออกผลเดือนกรกฎาคม – กันยายน

แหล่งที่พบ ป่าเต็งรัง

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ชอบแสงแดดจัด ขึ้นได้ดีในดินแทบทุกชนิด

ฤดูกาลใช้ประโยชน์ เดือนเมษายน - มิถุนายน

ส่วนที่ใช้เป็นอาหาร ใบอ่อน ยอดอ่อน และดอก รับประทานเป็นผักสด นำไปปรุงรสอาหาร ทำให้มีรสเปรี้ยว เมล็ดอ่อน รับประทานได้

รส เปรี้ยว เมล็ดอ่อน รสหวาน

การขยายพันธุ์ เพาะเมล็ดและปักชำราก