

จิ้งจกหางเรียบ

- ลักษณะ :** ขนาดวัดจากปลายปากถึงก้น 55–64 มม. หางยาว 60–73 มม. ขนาดเดียวกับจิ้งจกหางหนาม สีลำตัวออกสีเรียบ ๆ ตลอดทั้งตัว ตามสีข้าง ลำตัวมีเกล็ดมนขนาดใหญ่ หางค่อนข้างแบน ขอบสองข้างเป็นริ้วเล็กๆ ตลอดหาง นิ้วเท้าเรียวกว่านิ้วเท้าของจิ้งจกหางหนาม เกล็ดบนหัวมีขนาดใหญ่กว่าเกล็ดบนหลัง ขอบด้านข้างมีรอยพับเป็นผิวหนังสองข้าง โคนหางพองออกเล็กน้อย และมักมีตุ่มเล็ก ๆ อยู่ข้างละคู่
- ลำตัวส่วนใหญ่สีออกเทาอ่อน หรือน้ำตาลออกเหลืองเรียบทั้งตัว บนหัวอาจมีสีคล้ำกว่าหลัง ไตทองสีเหลืองอ่อน ใต้เท้าสีคล้ำ ไม่ค่อยมีจุดละเอียดสีคล้ำมากนักบริเวณภายใต้ลำตัว บางตัวมีจุดสีขาว ๆ กระจายอยู่บนลำตัว และพาดเป็นลายขวางเล็ก ๆ บนหาง
- เขตแพร่กระจาย :** มีการแพร่กระจายกว้างขวางมาก เช่นเดียวกับจิ้งจกหางหนาม โดยมีสาเหตุมาจากการติดไปกับมนุษย์ พบตั้งแต่อินเดียตลอดไปจนถึงออสเตรเลีย และพบไปถึงเกาะตาฮิติในหมู่เกาะทะเลใต้
- ในบริเวณพื้นที่ป่าสะแกราช พบน้อยมากเพียง 3 ครั้ง ๆ ละเพียงตัวเดียว ในบริเวณป่าดิบแล้ง โดยเฉพาะบริเวณเขื่อนบนและบนเสาป้ายบอกชื่อถนนและป้ายติดชื่อต้นไม้ ไม่พบในบริเวณบ้านเรือน
- ที่อยู่อาศัย:** ในบริเวณพื้นที่ศึกษาพบว่าจะอยู่ในบริเวณที่ไม่ค่อยมีจิ้งจกหางหนามอาศัยอยู่ เช่น บริเวณลำตัวเขื่อนบน วิ่งไปมาบนทางลาดหน้าเขื่อน บางตัวซ่อนอยู่ด้านหลังป้ายบอกเส้นทางจราจร ป้ายชื่อโครงการวิจัยและป้ายสังกัดสัตตชื้อต้นไม้ บางครั้งพบได้ตามเสารั้วซีเมนต์ที่ใช้ขึงลวดหนามกั้นอาณาเขตของสถานีฯ ไม่เคยพบมาหากินปะปนกับจิ้งจกหางหนามในบริเวณบ้านเรือน
- อุปนิสัย :** ส่วนใหญ่ในเวลากลางวัน พบซ่อนตัวด้านหลังป้ายต่างๆ และในซอกบนตัวเขื่อน แม้แต่ในรูท่อระบายน้ำบนสันเขื่อน พบอยู่โดดเดี่ยว เวลากลางคืน ออกมาได้หากินบนเสาป้าย เสารั้วซีเมนต์ และบนตัวเขื่อน วิ่งหนีได้รวดเร็ว และมักวิ่งหนีไปจนเข้าซอกที่อาศัย ไม่ค่อยวิ่งไปหยุดไปเหมือนจิ้งจกหางหนาม หากจวนตัวจะอยู่บนป้าย พบว่าบางตัวกระโดดหนีลงสู่พื้นดิน แล้วมุดหนีไปได้ไปไม่และวัสดุต่างๆ บนพื้นดิน

สถานภาพ : มีประชากรน้อยมากในบริเวณป่าสะแกราช ซึ่งเป็นปริมาณที่เหมือนกับที่พบในบริเวณอื่นๆ ของประเทศ



จิ้งจกหางเรียว

Garnot's House Gecko

Hemidactylus garnotii (Dumeril & Bibron, 1836)

Squamata