

## งูลายสอสวน

**ลักษณะ :** ขนาดวัดจากปลายปากถึงก้น 254–310 มม. หางยาว 104–123 มม. (ทุกตัวเป็นงูอายุอ่อน) ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ตัวยาวเรียว หางยาวประมาณ 35–40% ของความยาวหัวและลำตัว เกสึลลำตัวตอนต้นมีสันจางๆ แต่ตอนปลายลำตัวสันบนเกสึลจะเห็นได้ชัดเจน แถวเกสึลรอบตัวตรงกึ่งกลาง 19 แถว เกสึลข้างลำตัว 2–3 แถวเรียว เกสึลใต้ท้องมีจำนวน 130–132 เกสึล เกสึลใต้หางแบ่งออกเป็นสองแถว

สีลำตัวดูคล้ายพรอยคล้ายสีขาวยอกหรือสีตาข่ายดำสลับน้ำตาลอ่อน เกสึลบนหัวสีออกน้ำตาลเขียว เกสึลริมฝีปากสีออกจางกว่าเกสึลอื่นๆ โดยรอบ ตรงท้ายท้องมีลายพาดขวางคล้ายบังชัดเจน ใต้ท้องสีขาวยอกเขียว เกสึลใต้ท้องแต่ละเกสึลมีลายพาดสีดำตรงขอบหลัง

**เขตแพร่กระจาย :** เนปาล จีนตอนใต้ ไทย ลาว เวียดนาม กัมพูชาลงไปถึงมาเลเซีย

ในบริเวณพื้นที่ป่าสะแกราช พบไม่ชุกชุมเหมือนงูลายสาบคอแดง แต่พบในสภาพนิเวศเดียวกัน คือในป่าดิบแล้งและบริเวณรอยต่อระหว่างป่าดิบแล้ง และป่าเต็งรัง ในฤดูฝนพบในป่าเต็งรังด้วย

**ที่อยู่อาศัย :** ในระยะก่อน พบบ่อยๆ ตามริมลำห้วย เช่น บริเวณน้ำตก ถ้ำหินเขียว ถ้ำจางง จนถึงห้วยน้ำเค็ม ปัจจุบันพบเพียง 4 ตัว ทุกตัวเป็นงูวัยรุ่น ขนาดยังไม่โตเต็มที่ สองตัวพบริมลำห้วยตรงที่กั้นน้ำก่อนลงสู่ห้วยน้ำเค็ม ตัวหนึ่งพบที่คลองยางแรด และตัวสุดท้ายพบที่บนถนนในป่าเต็งรัง ในฤดูฝนจึงพบอาศัยอยู่ริม ลำห้วย เลื้อยไปตามซอกหิน และบนใบไม้แห้งบนพื้นป่า เมื่อมีฝนตกชุก จึงหากินไถลออกไปจากลำห้วย เข้าไปในป่าเพ็ก และป่าเต็งรัง

**อุปนิสัย :** เลื้อยหากินอย่างช้าๆ ไปตามชั้นใบไม้แห้งบนพื้นป่า หรือบางครั้งไปตามซอกหินริมลำห้วย หรือในลำห้วยแห้ง เพื่อหากินเขียดขนาดเล็กกิน ครั้งหนึ่งเคยพบไล่จับจิ้งเหลนภูเขาเกสึลเรียบ แต่ไม่อาจจับได้ ในเวลาที่มีฝนตกพราวๆ พบเลื้อยไปตามริมถนน หรือเลื้อยข้ามตัดถนนบ่อยๆ มักจะตามจับเหยื่อไม่ทัน

เวลาวางไข่จะวางไข่รูปทรงยาว 7 ฟอง คล้ายแคปซูลยา ขนาดฟองละราว 70 มม. กว้างราว 30 มม. ไข่ทุกฟองจะติดกันทางด้านข้างเป็นแพเรียงเป็นดับ 2 แถว แถวบนมี 4 ฟอง แถวล่างอีก 3 ฟอง จุดพบไข่ชุด 7 ฟองนี้ ไต่จอมปลวกเดี่ยวๆ ในพุ่มต้นตะเคียน บริเวณใกล้ๆ กับคลองยางแรดในป่าดิบแล้ง

**สถานภาพ :** มีประชากรลดลงจากอดีตมาก แต่ยังคงมีระดับปานกลาง พบพบได้เป็นครั้งคราวในบริเวณพื้นที่ศึกษา



งูลายสอสวน