

กรุงเขมา



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Cissampelos pareira* L. var. *hirsuta* (Buch. ex DC.)
Forman

ชื่อพื้นเมือง เครือหมาน้อย (นครราชสีมา, ภาคตะวันออก); ก้นปิด
(ภาคตะวันตกเฉียงใต้); กรุงเขมา (นครศรีธรรมราช);
ขงเขมา, พระพาย (ภาคกลาง); เปิ้ล้าเลือด (แม่ฮ่องสอน);
สีฟัน (เพชรบุรี); อะกามินเยาะ (มลายู - นราธิวาส)

ชื่อวงศ์ MENISPERMACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ต้น กรุงเขมาเป็นไม้เถาเลื้อยขนาดเล็ก เถา ใบ และช่อดอกมีขนนุ่มปกคลุม
ใบ ใบเป็นใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปหัวใจ ปลายใบแหลมแกมมน โคนใบแบบก้น
ปิด มีขนนุ่มๆ ปกคลุมทั้งสองด้าน

ดอก ดอกออกเป็นช่อเล็ก ๆ สีขาว เป็นกระจุกตามซอกใบ ออกดอกเดือน
พฤษภาคม - กรกฎาคม

ผล ผลกลมเล็ก สีเขียว ผลสุกสีน้ำตาล มีหนึ่งเมล็ดออกผลเดือนกรกฎาคม -
สิงหาคม

แหล่งที่พบ พบกระจายตามป่าเต็งรัง และป่าคันทรง

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ชอบแสงแดดรำไร ขึ้นได้ดีในดินร่วนปนทราย

ฤดูกาลใช้ประโยชน์ ฤดูฝน

ส่วนที่ใช้เป็นอาหาร เถาและใบ คั้นเอาน้ำ ผสมกับเครื่องปรุงอาหาร ทิ้งไว้ 3 - 5
นาที จะจับตัวลื่นเหมือนวุ้นรับประทานได้

รส จืดเย็น

การขยายพันธุ์ เพาะเมล็ด