

กะเจียน



2006 3 21



21 3 2006



21 3 2006

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Polyalthia cerasoides* (Roxb.) Benth. ex Bedd.

ชื่อพื้นเมือง ไชเตน (นครราชสีมา); กะเจียน (ชลบุรี); คำสามซึก (เชียงใหม่);
แคหาง (ราชบุรี); จันทน์แดง, ทวายเด่น (ขอนแก่น); พญารากดำ
(ชลบุรี); โมดอง (ระยอง); สะบันงาป่า (ภาคเหนือ); เหลือง (ลำปาง)

ชื่อวงศ์ ANNONACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ต้น กะเจียนเป็นไม้ต้นขนาดกลาง สูงถึง 15 เมตร ลำต้นเปลา เปลือกเรียบ
กิ่งเกือบตั้งฉากกับลำต้น กิ่งอ่อนมีขนนุ่มปกคลุม

ใบ ใบเป็นใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปใบหอก ปลายใบเรียวแหลม โคนใบมน ใบ
อ่อนมีขนอ่อนนุ่ม หลังใบสีเขียวเข้ม ท้องใบสีจาง

ดอก ดอกออกเป็นดอกเดี่ยว หรือออกเป็นกลุ่มตามกิ่ง กลีบดอกแข็ง มี 6 กลีบ
ดอกอ่อนสีเขียว แก่แล้วเปลี่ยนเป็นสีเหลือง ออกดอกเดือนกุมภาพันธ์ –
มีนาคม

ผล ผลเป็นผลกลุ่ม อยู่บนแกนตุ้มกลม ผลย่อยป้อมกลม ปลายเป็นติ่ง ผล
อ่อนสีเขียว แก่สีเหลือง ออกผลเดือนมีนาคม – เมษายน

แหล่งที่พบ ป่าเต็งรังและป่าดิบแล้ง

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ชอบแสงแดดจัด ขึ้นได้ดีในดินร่วนซุย

ฤดูกาลใช้ประโยชน์ ต้นฤดูฝน

ส่วนที่ใช้เป็นอาหาร ผลสุก รับประทานเนื้อหุ้มเมล็ด

รส หวาน

การขยายพันธุ์ เพาะเมล็ด