


กาน้ำ



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Glochidion coccineum* (Buch.– Ham.) Müll.Arg.
 ชื่อพื้นเมือง ตานา (นครราชสีมา); กาน้ำ (กาญจนบุรี); จานา (ขอนแก่น);
 ชุมเล็ดเล็ก (ชัยนาท); ไต้หยุ่งชะ (กะเหรี่ยง – กาญจนบุรี);
 มะยมป่า (กาญจนบุรี)
 ชื่อวงศ์ EUPHORBIACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ต้น กาน้ำเป็นไม้ต้นขนาดเล็ก สูง 5 – 10 เมตร เปลือกต้นสีน้ำตาล
 เปลือกใน สีน้ำตาลอมแดง กิ่งอ่อนมีขนนุ่มละเอียด
 ใบ ใบเดี่ยว เรียงสลับตามกิ่ง รูปไข่แกมรูปขอบขนานหรือรูปรีแกมรูปใบหอก
 ดอก ออกเป็นช่อกระจุก ออกตามซอกใบ ดอกย่อยหลายดอกเรียงตัวแน่น
 กลีบดอกสีเหลืองแกมเขียว

ผล ผลรูปกลมแป้น มี 16 – 20 พู ผลแก่สีน้ำตาล

แหล่งที่พบ ป่าดิบแล้ง ริมลำห้วย

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ชอบแสงแดดรำไร ขึ้นได้ดีในดินค่อนข้างชื้น

ฤดูกาลใช้ประโยชน์ ตลอดปี

ส่วนที่ใช้เป็นอาหาร ใบอ่อน ยอดอ่อน รับประทานเป็นผักสดจิ้มกับน้ำพริก

รส มัน ฝาดเล็กน้อย

การขยายพันธุ์ เพาะเมล็ด