



กาสามปึก ๒



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Flemingia strobilifera* Craib

ชื่อพื้นเมือง กาสามปึก (เชียงใหม่)

ชื่อวงศ์ LEGUMINOSAE – PAPILIONOIDEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ต้น กาสามปึกเป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก สูงประมาณ 1 เมตร กิ่งอ่อนเป็นสามเหลี่ยม มีขนสีน้ำตาล กิ่งแก่เรียบ

ใบ ใบเป็นใบประกอบแบบนิ้วมือ มีใบย่อยสามใบ เรียงสลับ ปลายใบแหลม โคนใบสอบ หลังใบสีเขียว ท้องใบสีเขียวอ่อน

ดอก ดอกออกเป็นช่อ ช่อดอกยาว 2-12 ซม. ใบประดับรูปใบหอกแกมรูปไข่ ปลายเรียวแหลม ออกดอกเดือนเมษายน – พฤษภาคม

ฝัก ฝักเป็นรูปกระสวยเรียวยาว เมื่อแก่แตกออก เมล็ดกลม สีน้ำตาล ออกฝักเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน

แหล่งที่พบ ป่าเต็งรัง

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ชอบแสงแดดรำไร ดินร่วนซุย

ฤดูกาลใช้ประโยชน์ ฤดูฝน

ส่วนที่ใช้เป็นอาหาร ยอดอ่อน ผลอ่อน รับประทานเป็นผักสดกับน้ำพริก ลาบ รส ผัดมัน

การขยายพันธุ์ เพาะเมล็ด