

ช้อย



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Streblus asper* Lour.

ชื่อสามัญ Siamese rough bush, Tooth brush tree.

ชื่อพื้นเมือง ช้อย (นครราชสีมา, ทั่วไป); กักไม้ฝอย (ภาคเหนือ); ชะโยเล่ (กะเหรี่ยง – แม่ฮ่องสอน); ดอกชะแห่น (กะเหรี่ยง – กาญจนบุรี); สัมพอ (เลย); สะนาย (เขมร)

ชื่อวงศ์ MORACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ต้น ช้อยเป็นไม้ต้นขนาดกลาง สูงถึง 15 เมตร ลำต้นค่อนข้างคดงอ เป็นปุ่มปม ขึ้นเป็นต้นเดี่ยวหรือเป็นกลุ่ม เรือนยอดรูปทรงกลม กิ่งอ่อนมีขนสาเก
ใบ ใบเป็นใบเดี่ยว เรียงแบบสลับ ขอบใบหยัก ผิวใบสาเกทั้งสองด้าน ท้องใบสีจางกว่าหลังใบ ใบอ่อนสีเขียวอ่อน ใบแก่สีเขียวเข้ม

ดอก ดอกออกเป็นช่อขนาดเล็ก สีขาวหรือเหลืองอ่อน ตามซอกใบ ออกดอกเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์

ผล ผลกลม ขนาดเล็ก มีสีเขียว ผลสุกสีเหลือง เมล็ดกลมแข็ง สีขาว มีเนื้อเยื่อหุ้ม หนึ่งผลมี 1 เมล็ด ออกผลเดือนมีนาคม – เมษายน

แหล่งที่พบ ป่าเต็งรัง

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ขึ้นได้ดีในดินแทบทุกชนิด ชอบแดดจัด

ฤดูกาลใช้ประโยชน์ ฤดูร้อน

ส่วนที่ใช้เป็นอาหาร ผลสุก เนื้อหุ้มเมล็ดรับประทานได้

รส หวาน

การขยายพันธุ์ เพาะเมล็ด