



ธนนไชย



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Buchanania siamensis* Miq.

ชื่อพื้นเมือง ธนนไชย, ศรีธนนไชย (นครราชสีมา); พังพวยนก, พังพวยป่า, ลั่นไชย (ราชบุรี, ภาคใต้); รวงไช, รวงไช, รวงไทย (อุบลราชธานี); ลังไช (ปราจีนบุรี)

ชื่อวงศ์ ANACARDIACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ต้น ธนนไชยเป็นไม้ต้นขนาดกลาง ผลัดใบ สูง 5 – 10 เมตร เปลือกต้นหนา สีเทา แตกเป็นสะเก็ดเล็ก ๆ เปลือกในสีแดงอมขาว

ใบ ใบเดี่ยว เรียงสลับ ออกเป็นกระจุกใกล้ปลายกิ่ง ใบรูปหอกกลับหรือรูปรี ปลายใบมน โคนใบรูปลิ้นแกมสอบเรียว ผิวใบด้านบนเรียบ ท้องใบมีขนละเอียด

ดอก ดอกออกเป็นช่อตามซอกใบ ดอกย่อยจำนวนมาก สีขาวแกมสีเหลืองอ่อน ออกดอกเดือนตุลาคม – ธันวาคม

ผล ผลเดี่ยว รูปค่อนข้างกลม ผลอ่อนสีเขียว ผลสุกสีม่วงถึงดำ ออกผลเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม

แหล่งที่พบ ป่าเต็งรัง

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ชอบแสงแดดจัด ขึ้นได้ดีในดินร่วนซุย

ฤดูกาลใช้ประโยชน์ ฤดูร้อนต่อฤดูฝน

ส่วนที่ใช้เป็นอาหาร ใบอ่อน ยอดอ่อนและดอก รับประทานเป็นผักสดจิ้มกับน้ำพริก ลาบ ยำ ผลสุกรับประทานได้

รส ใบอ่อน ยอดอ่อนและดอก มีรสเปรี้ยว มัน ผลสุก รสหวานอมเปรี้ยว

การขยายพันธุ์ เพาะเมล็ด