



นมควาย



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Melodorum hahnii* (Finet & Gagnep.) Bân

ชื่อพื้นเมือง นมจั่ว (นครราชสีมา); นมควาย (ระยอง)

ชื่อวงศ์ ANNONACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ต้น นมควายเป็นไม้เถาเนื้อแข็ง เลื้อยพาดพันต้นไม้อื่นได้ไกล เปลือกเถาสีน้ำตาลหรือดำ ตามเถาและกิ่งมีขนนุ่มปกคลุม

ใบ ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปรีแกมรูปขอบขนาน ผิวใบด้านบนสีเขียวเข้ม ด้านล่างสีอ่อนกว่า ผิวใบมีขนปกคลุมหนาแน่นทั้งสองด้าน

ดอก ดอกออกเป็นช่อสั้นๆ ตรงปลายกิ่ง กลีบดอกสีเขียว เมื่อบานเปลี่ยนเป็นสีเหลือง ออกดอกเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน

ผล ผลกลุ่ม มีจำนวน 12 – 15 ผล ผลย่อยแต่ละผลรูปกลมรีถึงรูปทรงกระบอก ผลอ่อนสีเขียว ผลสุกสีแดงหรือส้ม เปลือกผลนุ่ม เนื้อหุ้มเมล็ดสีขาว มีเมล็ดจำนวนมาก ออกผลเดือนกรกฎาคม – กันยายน

แหล่งที่พบ ป่าดิบแล้ง

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ชอบแสงแดดรำไร ขึ้นได้ดีในที่ค่อนข้างชื้น

ฤดูกาลใช้ประโยชน์ ฤดูฝน

ส่วนที่ใช้เป็นอาหาร ผลสุก รับประทานได้

รสเปรี้ยวอมหวาน

การขยายพันธุ์ เพาะเมล็ด