

สกุล



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Terminalia calamansanai* (Blanco) Rolfe
ชื่อพื้นเมือง แหน, ปีกนก (นครราชสีมา); ขี้มอด (นครพนม); ตาโหลน (สตูล);
ตีนนก (จันทบุรี, ตราด); ประคำขี้ควาย (ภาคใต้); เปี้ยแคว
(เขมร – จันทบุรี); สกุนี, สัตคุณี (ราชบุรี); แหนแดง (ภาคเหนือ);
แฮ้น (ชุมพร, นครสวรรค์)

ชื่อวงศ์ COMBRETACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ต้น สกุนีเป็นไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูงได้ถึง 25 เมตร ผลัดใบ
เปลือกสีน้ำตาลเทา แตกเป็นร่องยาวตื้น กิ่งอ่อนมีขนนุ่มปกคลุม

ใบ ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับ รูปไข่แกมรูปรี ปลายใบเรียวแหลม แผ่นใบหนา
ท้องใบมีขนนุ่มปกคลุม หลังใบเกลี้ยงเป็นมัน

ดอก ดอกออกเป็นช่อแบบช่อเชิงลด สีครีมถึงสีเหลือง ออกที่ปลายกิ่งและซอก
ใบใกล้ปลายยอด ดอกย่อยจำนวนมาก กลีบเลี้ยงสีเขียวแกมเหลือง ไม่มี
กลีบดอก ออกดอกเดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์

ผล ผลแห้งเมล็ดแข็ง สีน้ำตาลปนเหลือง มีเมล็ดเดียว มีปีก 2 ปีก ออกผล
เดือนมีนาคม – พฤษภาคม

แหล่งที่พบ ป่าดิบแล้งและป่าเต็งรัง

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ชอบแสงแดดจัด ขึ้นได้ดีในดินแทบทุกชนิด

ฤดูกาลใช้ประโยชน์ เดือนมกราคม - มีนาคม

ส่วนที่ใช้เป็นอาหาร เมล็ดรับประทานได้

รส มัน

การขยายพันธุ์ เพาะเมล็ด