

สองสลึง



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Lophopetalum duperreanum* Pierre

ชื่อพื้นเมือง พังคิใหญ่, พังคิตัน (นครราชสีมา); ซี, พะเนียงหัด (อุบลราชธานี);
ผีเสื้อแดง (เชียงใหม่); ยายบู, สองสลึง (ชลบุรี, พิษณุโลก)

ชื่อวงศ์ CELASTRACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ต้น สองสลึงเป็นไม้ต้นขนาดกลาง สูง 8 – 15 เมตร ผลัดใบ ลำต้นเปลาตรง เปลือกนอกสีเทาเข้ม ก่อนข้างเรียบ หรือแตกเป็นสะเก็ดรูปสี่เหลี่ยม เปลือกในสีน้ำตาลแดง

ใบ ใบเดี่ยว เรียงตรงข้ามหรือเกือบตรงข้าม ใบรูปไข่ ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ เนื้อใบหนา ผิวเกลี้ยงทั้งสองด้าน ก้านใบอ่อนสีแดง

ดอก ดอกเป็นดอกช่อ ออกตามปลายกิ่ง ดอกย่อยขนาดเล็ก กลีบดอกสีขาว ออกดอกเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม

ผล ผลห้อยตามแนวยาวเป็น 3 พู ผลแก่สีน้ำตาลแดง เมื่อแห้งแตกออกตามรอยประสาน เมล็ดแบน มีปีก ออกผลเดือนสิงหาคม – ตุลาคม

แหล่งที่พบ ป่าเต็งรัง

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ชอบแสงแดดจัด ขึ้นได้ดีในดินร่วนซุยไม่อุ้มน้ำ ฤดูกาลใช้ประโยชน์ เดือนเมษายน - มิถุนายน

ส่วนที่ใช้เป็นอาหาร ยอดอ่อน ใบอ่อน รับประทานเป็นผักสด กับน้ำพริกแจ่ว และลาบ

รส ฝาดมัน

การขยายพันธุ์ เพาะเมล็ด