


ส้มกบ



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Hymenodictyon orixense* (Roxb.) Mabb.

ชื่อพื้นเมือง ส้มกบ, อุโลก (นครราชสีมา, ภาคเหนือ); ลาดดา (ตรัง); ลู, ส้มลู (สุราษฎร์ธานี); สังเหาะ (กะเหรี่ยง – เชียงใหม่); ส้มเห็ด (ภาคใต้); อุโลก (ราชบุรี)

ชื่อวงศ์ RUBIACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ต้น ส้มกบเป็นไม้ต้นขนาดกลาง สูงถึง 30 เมตร ผลัดใบ เปลือกต้นหนา สีเทาปนน้ำตาล แตกเป็นสะเก็ด เปลือกในสีแดง

ใบ ใบเป็นใบเดี่ยว เรียงตรงข้ามสลับตั้งฉาก เป็นกระจุกที่ปลายกิ่ง รูปไข่ หรือรูปโล่ ปลายใบแหลม โคนใบมน ขอบใบเรียบ ผิวใบนุ่ม

ดอก ดอกออกเป็นช่อแยกแขนง ที่ซอกใบบริเวณปลายกิ่ง ดอกย่อยขนาดเล็ก กลีบดอกสีขาวหรือเหลืองอ่อน ออกดอกเดือนตุลาคม – ธันวาคม

ผล ผลรูปรี ผลแห้งสีน้ำตาลแดง เมล็ดมีปีกเป็นครีบบางๆ ที่ปลายเมล็ด ออกผลเดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์

แหล่งที่พบ ป่าเต็งรัง

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ชอบแสงแดดจัด ขึ้นได้ดีในดินร่วนปนทราย

ฤดูกาลใช้ประโยชน์ ฤดูฝน

ส่วนที่ใช้เป็นอาหาร ใบอ่อน ยอดอ่อน รับประทานเป็นผักสด ใช้ปรุงรสอาหาร จำพวกแกงส้ม ต้มยำ ห่อหมก

รส เปรี้ยว

การขยายพันธุ์ เพาะเมล็ด