



เม่าสร้อย



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Antidesma acidum* Retz.

ชื่อพื้นเมือง เม่าสาย (นครราชสีมา); มักเม่า (ลำปาง); เม่า (ภาคเหนือ);
เม่าตากวาย (เชียงราย); เม่าสร้อย (เลย)

ชื่อวงศ์ EUPHORBIACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ต้น เม่าสร้อยเป็นไม้พุ่มกึ่งไม้ต้นขนาดเล็ก สูง 6 เมตร เปลือกต้นสีเทา
เปลือกแตกเป็นสะเก็ด

ใบ ใบเดี่ยว รูปขอบขนานหรือรูปใบหอก ปลายใบแหลม ก้านใบสีน้ำตาลแดง
ดอก ดอกออกเป็นช่อ เรียวยาว ออกที่ปลายกิ่ง ช่อยาวถึง 10 เซนติเมตร ออก
ดอกเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม

ผล ผลกลมหรือแบนเล็กน้อย ผลอ่อนสีเขียว ผลแก่สีแดงดำ ออกผลเดือน
สิงหาคม – กันยายน

แหล่งที่พบ ป่าเต็งรัง

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ชอบแสงแดดจัด ขึ้นได้ดีในดินร่วน ไม่อุ้มน้ำ

ฤดูกาลใช้ประโยชน์ ปลายฤดูฝน

ส่วนที่ใช้เป็นอาหาร ผลอ่อนและผลแก่รับประทานได้หรือนำไปคั้นทำน้ำผลไม้

รส ผลสด รสเปรี้ยว ผลแก่ รสเปรี้ยวอมหวาน

การขยายพันธุ์ เพาะเมล็ด