


เสม็ดชุน



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Syzygium gratum* (Wight) S.N. Mitra var. *gratum*

ชื่อพื้นเมือง ผักเสม็ด, ผักเม็ก (นครราชสีมา); ไคร้เม็ด (เชียงใหม่); เม็ก (ปราจีนบุรี); เม็ดชุน (นครศรีธรรมราช); เสม็ด (สกลนคร, สตูล); เสม็ดเขา, เสม็ดแดง (ตราด); เสม็ดชุน (ภาคกลาง); ยี่มือแล (มลายู – ภาคใต้)

ชื่อวงศ์ MYRTACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ต้น เสม็ดชุนเป็นไม้ต้นกิ่งไม้ต้นขนาดเล็ก ไม่ผลัดใบ เปลือกต้นสีน้ำตาลแดง แตกสะเก็ดแผ่นบางๆ โคนต้นมักเป็นพูพอน

ใบ ใบเป็นใบเดี่ยว ออกตรงข้าม รูปใบหอก ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ

ดอก ดอกเป็นช่อดอกแบบช่อแยกแขนง ออกที่ปลายยอด ดอกเรียงชิดกัน คล้ายเป็นกระจุก สีเหลืองอ่อน ออกดอกเดือนมีนาคม - เมษายน

ผล ผลกลม สีขาว มีขนาดเล็ก ออกผลเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน

แหล่งที่พบ ป่าดิบแล้ง

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ชอบแสงแดดรำไร ขึ้นได้ดีในดินแทบทุกชนิด มักพบอยู่ตามริมลำห้วย

ฤดูกาลใช้ประโยชน์ เดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน

ส่วนที่ใช้เป็นอาหาร ใบอ่อน ยอดอ่อนรับประทานเป็นผักสดกับน้ำพริก ลาบ ยำ รสเปรี้ยว

การขยายพันธุ์ เพาะเมล็ด และตอนกิ่ง