

เหมือดจ๊ก



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Memecylon scutellatum* Naudin

ชื่อพื้นเมือง พะนาด, (นครราชสีมา); พลองขึ้นก (ปราจีนบุรี, ประจวบคีรีขันธ์); เหมือดจ๊ก, เหมือดพอง (ภาคเหนือ); เหมือดแอ (อุบลราชธานี)

ชื่อวงศ์ MELASTOMATACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ต้น เหมือดจ๊กเป็นไม้พุ่มกึ่งไม้ต้นขนาดเล็ก ผลัดใบ สูงถึง 9 เมตร เปลือกลำต้นสีน้ำตาลดำ แตกขรุขระเป็นร่องยาวตามต้น

ใบ ใบเป็นใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ ผิวใบเรียบ สีเขียวเข้มเป็นมัน

ดอก ดอกออกเป็นช่อกระจุกที่ซอกใบ กลีบดอกสีม่วงอมน้ำเงิน

ผล ผลเป็นผลเดี่ยว กลมแป้น ผลดิบสีเขียว ผลสุกสีม่วง หนึ่งผลมี 1 เมล็ด

แหล่งที่พบ ป่าเต็งรัง

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ชอบแสงแดดจัด ดินร่วนซุย ความชื้นต่ำ

ฤดูกาลใช้ประโยชน์ ฤดูฝน

ส่วนที่ใช้อาหาร ใบอ่อน ยอดอ่อน รับประทานเป็นผักสดกับอาหารจำพวกปลา

ยา ผลสุก รับประทานเป็นผลไม้

รส ฝาด มัน ผลสุก รสหวาน

การขยายพันธุ์ เพาะเมล็ด