

แดง



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Xylocarpus xylocarpa* (Roxb.) Taub. var. *kerrii* (Craib & Hutch.) I.C. Nielsen

ชื่อสามัญ Iron wood

ชื่อพื้นเมือง กร่อม (ชาวนน – นครราชสีมา); ควาย (กะเหรี่ยง – เชียงใหม่, กาญจนบุรี); ไคว, เพร์ (กะเหรี่ยง – แม่ฮ่องสอน); จะลาน, จาลาน (เงี้ยว – แม่ฮ่องสอน); แดง (ทั่วไป); ตะกร่อม (ทอง – จันทบุรี); ปราณ (ส่วย – สุรินทร์); ไปรน์ (ศรีสะเกษ); ผ้าน (ละว้า – เชียงใหม่); เพี้ย (กะเหรี่ยง – ตาก); สะกรอม (เขมร – จันทบุรี)

ชื่อวงศ์ LEGUMINOSAE – MIMOSOIDEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ต้น แดงเป็นไม้ต้นขนาดใหญ่ สูงถึง 30 เมตร ผลัดใบ ลำต้นมักคดงอ แตกกิ่งต่ำ เปลือกต้นสีครีมอมน้ำตาล แตกล่อนเป็นสะเก็ดแผ่นบางๆ

ใบ ใบเป็นใบประกอบแบบขนนกสองชั้นปลายคู้ ใบย่อยเรียงตรงกันข้าม รูปขอบขนานแกมรูปไข่ ใบอ่อนสีน้ำตาลแดง

ดอก ดอกออกเป็นช่อแบบช่อกระจุกแน่น ทรงกลม คล้ายดอกกระถิน ออกดอกเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม

ผล ฝักรูปขนมหูเปียกปุ่น เปลือกแข็ง ฝักแก่สีน้ำตาลอมเทา แก่จัดแตก้าออกตามรอยประสานเป็นสองซีก ฝักที่แตกมักจะบิดงอ เมล็ดแบนมี 6 – 10 เมล็ด ออกผลเดือนมีนาคม - เมษายน

แหล่งที่พบ ป่าเต็งรัง

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ชอบแสงแดดจัด ขึ้นได้ดีในดินร่วน ไม่อุ้มน้ำ

ฤดูกาลใช้ประโยชน์ ฤดูหนาว

ส่วนที่ใช้เป็นอาหาร เมล็ดอ่อนรับประทานได้ เมล็ดแก่นำไปคั่วหรือเผาไฟให้สุกรับประทานได้

รส มัน

การขยายพันธุ์ เพาะเมล็ด