

นกอีเสือหัวดำ

- ลักษณะ :** ขนาดลำตัวยาว 25 ซม. มีหางยาวกว่านกอีเสืออื่น ๆ เป็นนกที่มีสีสันตัดกันสวยงาม บริเวณหัว ปีก และหางมีสีดำ ด้านหลังลำตัวมีสีน้ำตาลแดง ด้านล่างของลำตัวมีสีขาว สีข้างหรือด้านข้างลำตัวมีสีน้ำตาลแดงสดใส ขณะบิน จุดขาว 2 จุดที่ปีกเห็นได้ชัดเจน นกที่ยังโตไม่เต็มวัย สีจะทึบกว่า หัวและท้ายทอยสีเทาตัดกับแถบคาดตาสีดำที่ใบหน้า มีลายเกล็ดบริเวณ หัว ท้ายทอย ด้านหลังและสีข้าง
- เขตแพร่กระจาย :** เอเชียตอนใต้ อินเดีย จีนตอนใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เกาะไหหลำ ใต้หวัน หมู่เกาะ ชุนดา ฟิลิปปินส์ และนิวกินี
- ที่อยู่อาศัย :** พบตามทุ่งโล่ง หนองบึง จากที่ราบไปจนถึงระดับความสูง 1,800 ม. ในป่าสะแกราช พบบริเวณป่าเต็งรัง
- อุปนิสัย :** มักพบหากินโดดเดี่ยวตามลำพัง มีอาณาเขตของตัวเอง เกาะเด่นตามยอดไม้พุ่ม เสาหลัก หรือสายไฟฟ้า มองหาแมลงและสัตว์ขนาดเล็ก เมื่อพบจะรีบบินพุ่งออกไปจับ ค่อนข้างก้าวร้าวและหวงถิ่น เหยื่อที่จับได้จะไม่กินทันที จะกักตุนไว้โดยเสียบตามหนามแหลมของต้นไม้ อุปนิสัยเช่นนี้พบในกลุ่มนกอีเสือ โดยเฉพาะในช่วงฤดูผสมพันธุ์
- ในจำนวนนกอีเสือ 5 ชนิดที่พบในประเทศไทย มี 2 ชนิดเท่านั้นที่เป็นนกประจำถิ่น ซึ่งทำรัง วางไข่ในประเทศไทย นกอีเสือหัวดำเป็นหนึ่งในนกประจำถิ่นนั้น ผสมพันธุ์ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน รังเป็นรูปถ้วยหยาบ ๆ โดยใช้กิ่งไม้เล็ก ๆ และต้นหญ้าวางซ้อนกัน และขัดหรือสานกันเล็กน้อย ร่องรังด้วยวัสดุอ่อนนุ่ม เช่น ใบหญ้า รากฝอย ทำรังตามพุ่มไม้และไม้ต้นขนาดกลาง วางไข่ครั้งละ 4 – 6 ฟอง พ่อแม่กันช่วยกันสร้างรัง ฟักไข่ และเลี้ยงดูลูกอ่อน ระยะฟักไข่ 15 – 16 วัน
- สถานภาพ :** เป็นนกประจำถิ่น พบไม่บ่อยนักในป่าสะแกราช ชนิดย่อยที่พบในป่าสะแกราช คือ ชนิดย่อย *longicaudatus*

กฎหมายจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง



นกอีเสือหัวดำ

Long-tailed Shrike, Black-headed Shrike

Lanius schach Linnaeus, 1758.

Laniidae

Passeriformes