

นกตีทอง


- ลักษณะ :** ลำตัวยาว 16 ซม. เป็นนกโพระดกที่มีขนาดเล็กที่สุด ลำตัวด้านบนสีเขียว บริเวณใบหน้าและอกมีสีส้มตัดกันสวยงาม คีอมีหน้าผากสีแดง คอด้วยแถบสีดำ ตัวและใต้คอสีเหลือง ล้อมรอบด้วยแถบหน้าสีดำจากหางตามายังปาก คางและคอสีเหลือง อกส่วนบนสีแดง อกส่วนล่างสีเหลือง ท้องสีครีมมีลายขีดสีเขียว
- เขตแพร่กระจาย :** ปากีสถาน ตะวันตกเฉียงใต้ของจีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สุมาตรา ชวา และฟิลิปปินส์
- ที่อยู่อาศัย :** ป่าดิบแล้ง ป่าเต็งรัง ป่ารุ่ม
- อุปนิสัย :** พบตัวเดียวหรือเป็นคู่ เกาะอยู่บนต้นไม้ กินผลไม้ แมลง และหนอน กินอิ่มแล้วจะไปเกาะต้นไม้และส่งเสียงร้องเป็นเวลานาน จนกว่าจะหิวจึงเริ่มออกหากินใหม่ ผสมพันธุ์ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม ทำรังอยู่ตามโพรงไม้ วางไข่ครั้งละ 2-4 ฟอง ใช้เวลาฟักไข่ 13-14 วัน
- สถานภาพ :** นกประจำถิ่น พบในป่าสะแกราช











นกตีทอง

Coppersmith Barbet

Megalaima haemacephala (Muller, 1776)