

## อิงขางดำ

**ลักษณะ :** ขนาดวัดจากปลายปากถึงก้น 15–22 มม. ลำตัวแบนราบ ท้องป่อง หัวแหลม ไม่เห็นแผ่นหู มีรอยพับของผิวหนังจากลูกตาไปยังรักแร้ รูจมูกอยู่ก่อนไปทางปลายปากมากกว่าใกล้ตำแหน่งลูกตา นิ้วมือค่อนข้างสั้น ปลายนิ้วแผ่เป็นแผ่นแบน ขาคู่หลังสั้น นิ้วเท้ามีพังผืดยึดเพียงชนิดเดียว

ผิวหนังเรียบสีเทาคล้ำ หัวสีคล้ำกว่าหลัง บางตัวมีแผ่นหลังสีออกน้ำตาลแดง แผ่นหลังมีจุดสีดำเล็ก 1 คู่ ตรงกึ่งกลาง หน้าและด้านข้างลำตัวสีคล้ำจนเกือบดำสนิท ขาและแขนมีลายพาดสีจาง ตรงก้นมีปื้นสีดำใหญ่เด่นชัด ได้ทองสีออกเหลืองอ่อน ๆ มีจุดละเอียดสีดำกระจายอยู่ทั่วไต่คอและไต่คาง

**เขตแพร่กระจาย :** มีเขตการกระจายกว้างขวาง พบอาศัยตั้งแต่อินเดีย พม่า จีนตอนใต้ เกาะไหหลำ เวียดนาม ลาว ไทย กัมพูชาจนถึงมาเลเซียและอินโดนีเซีย

ในบริเวณป่าสะแกราช สำรวจพบเฉพาะในป่าดิบแล้งและป่าเต็งรัง ในปริมาณที่น้อยมากเพียงบริเวณละ 2–3 ตัว เชื่อว่ามีการกระจายในบริเวณทั่วทั้งป่าธรรมชาติทั้งสองแบบ แต่ไม่พบในบริเวณป่าปลูก บริเวณที่พบมากที่สุดเป็นบริเวณสถานีวิจัยด้านหอประชุมหลวงราช โดยมีแอ่งน้ำขังที่ไช้วางไข่ พบมีลูกออกอยู่ในแอ่งนี้ด้วย

**ที่อยู่อาศัย :** ชุกซ่อนตัวใต้ใบไม้แห้ง กองหิน กองหญ้า และวัสดุอื่นๆ บนพื้นดิน มักอยู่ไม่ไกลจากแหล่งขยายพันธุ์ซึ่งเป็นแอ่งน้ำขังที่มีกระจายอยู่ทั่วบริเวณที่ตั้งของสถานีวิจัย ฯ

**อุปนิสัย :** มีความว่องไวในการชุกซ่อนตัวใต้ใบไม้แห้งและกระโดดหนีได้ไกล เวลาตกลงสู่พื้นดินจะรีบพลิกตัวหลบเข้าใต้ใบไม้และวัสดุทันที ไม่นอนหมอบนิ่งอยู่ กับที่ตั้งเช่นอื่นชนิดอื่น ๆ จึงจับตัวมาศึกษาได้ค่อนข้างยาก

ฤดูวางไข่ตกอยู่ในราวเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน ช่วงปลายฤดูฝน ออกไข่เป็นแพลอยในแอ่งน้ำขังที่มีน้ำในระดับตื้นๆ (6-8 ซม.) ลูกออกหากินอยู่กลาง ๆ น้ำเป็นฝูงแน่น

**สถานภาพ :** พบชุกชุมในบริเวณสถานีวิจัย ฯ ที่มีสภาพแวดล้อมเหมาะในการดำรงชีวิต ยังมีประชากรอีกมากกระจายกันอยู่ห่างๆ กันทั่วทั้งป่าดิบแล้งและป่าเต็งรังที่มีแอ่งน้ำอยู่ในบริเวณ.



## อึ่งข้างดำ

### **Dark-sided Chorus Frog**

*Microhyla heymonsi* Vogt, 1911

Anura (Salientia)