

วัวแดง

- ลักษณะ :** ความยาวลำตัวและหัว 190-225 ซม. หางยาว 65-70 ซม. สูง 155-165 ซม. น้ำหนัก 600-800 กิโลกรัม วัวแดงมีลักษณะคล้ายวัวบ้าน แต่รูปร่างสูงใหญ่และปราดเปรียวกว่า สีออกน้ำตาลแดง ลักษณะเด่นคือมีวงก้นสีขาว มีขนสีขาวรอบตา รอบปาก รอบจมูก และขาทั้ง 4 ข้างมีสีขาวตั้งแต่หัวเข่าจนถึงกีบเท้า คล้ายสวมถุงเท้าขาว ตัวเมียมีวงเขาที่แคบกว่าเขาของตัวผู้และมีขนาดเล็กกว่า
- เขตแพร่กระจาย :** พม่า ไทย ลาว เวียดนาม กัมพูชา เกาหลี เกือบอร์เนียว
- ที่อยู่อาศัย :** หากินในที่โล่งแจ้ง ป่าโปร่ง หรือทุ่งหญ้าสลับกับป่าไผ่ ในป่าสะแกราชมียุพบรอยเท้าวัวแดงบริเวณซบตามี เมื่อประมาณ 6 ปีมาแล้ว แต่ปัจจุบันไม่พบตัว
- อุปนิสัย :** อยู่รวมกันเป็นฝูง มีจำนวนตั้งแต่ 4-25 ตัว ประกอบด้วยตัวเมียและลูกวัว โดยตัวเมียที่มีอายุมากที่สุดเป็นผู้นำฝูงออกหากินเฉพาะเวลากลางคืน มีตัวผู้ที่แข็งแรงที่สุดทำหน้าที่เป็น “จ่าฝูง” ชอบกินหญ้ามากกว่าใบไม้และชอบกินดินโป่งเพื่อเป็นอาหารเสริม ฤดูผสมพันธุ์ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน ตั้งท้องนาน 9.5-10 เดือน ตกลูกครั้งละ 1 ตัว ให้ลูกได้ทุกปี วัวแดงมีอายุยืน 20-25 ปี
- สถานภาพ :** อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง และจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง



วัวแดง

Banteng

Bos javanicus (d' Alton, 1823)

Bovidae

Artiodactyla