

เต่าเหลือง

ลักษณะ : ขนาดวัดจากกระดองหลัง 134 และ 128 มม. กว้าง 104 และ 76 มม. (จากลูกเต่า 2 ตัว) เป็นเต่าบกชนิดเดียวที่พบในบริเวณนี้ กระดองหลังโค้งนูน กระดองท้องเรียบ นูนลงเล็กน้อย หัวมีเกล็ดคลุมหนา ขาทั้งสี่มีเล็บ ไม่พบมีพังคืดที่นิ้วเท้า

ลำตัวสีออกเหลืองส้ม หัวสีจางกว่าเห็นได้ชัด บริเวณเกล็ดกระดองหลังมีลายแถมสีคล้ำๆ กระจายไปทั่วทุกเกล็ด เกล็ดใต้ท้องสีเหลืองจางกว่าและมีลายแถมเล็กๆ ไม่มากนัก ส่วนใหญ่ลายแถมอยู่ทางด้านระหว่างขาคู่หลัง

เขตแพร่กระจาย : ตั้งแต่เนปาล บังกลาเทศ ถึงอัซสัม อินเดียตะวันออก ไปถึงพม่า ลาว ไทย เวียดนาม กัมพูชา ลงไปจนถึงเมืองปิ่นังในมาเลเซีย

ในบริเวณป่าสะแกราช สัมรพบเพียง 2 ตัว ทั้งสองตัวเป็นลูกเต่าอายุประมาณ 1-2 ปี ตัวแรกพบในป่าเต็งรัง บริเวณเส้นทางไปสู่สันพะยอม ในเดือนพฤศจิกายน 2543 พบซุกตัวอยู่ในกองหินริมทางเดิน อีกตัวหนึ่งพบในป่าดิบแล้ง บริเวณริมลำธารใกล้เขื่อนบนในเดือนมกราคม 2544

ที่อยู่อาศัย : โดยธรรมชาติ เต่าเหลืองจะเดินหากินในฤดูฝน และซุกซ่อนตัวในฤดูแล้ง จากการศึกษาพบเฉพาะในฤดูแล้ง ไม่พบในฤดูฝนเลย และพบเฉพาะลูกเต่าที่ซุกตัวนอนในกองหินริมทางเดิน และอีกตัวเดินอยู่บนทางเดินมุ่งไปสู่ลำห้วย

อุปนิสัย : หาอาหารส่วนใหญ่ในฤดูฝน หรือช่วงฤดูฝนต่อฤดูหนาว โดยปกติชอบกินเห็ดโคน หนอนเพี้ย ผลไม้สุกร่วงหล่นบนพื้นป่า แต่ยังไม่เคยพบขณะกินอาหารเลย การพบแต่ละครั้งเป็นการบังเอิญจากการหาพวกจิ้งเหลนและงูที่ซ่อนตัวตามซอกหินริมทางและริมลำห้วย

สถานภาพ : เชื่อว่าใกล้จะสูญพันธุ์ไปจากบริเวณ เพราะมีคนแอบลักลอบมาจับไปเป็นอาหารบิละมาก ๆ โดยพวกที่มาเก็บเห็ดโคน ผักหวาน ผักสะตอ และลูกมะแว้ง หากเผชิญพบเต่าเหลือง ก็มักจะนำออกไปเป็นอาหารด้วย ควรมีการหาทางเลี้ยงเพิ่มจำนวน และปล่อยออกสู่ธรรมชาติโดยด่วน

กฎหมายจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง



เต่าเหลือง

(ชื่ออื่น : เต่าเพ็ก, เต่าโคก)

Elongated Tortoise

Indotestudo elongata (Blyth, 1853)

Testudinidae

Chelonia (Testudines)