

๗ ตุกแกป่าดงพญาเย็น

ลักษณะ : ขนาดตัวจากปลายปากถึงก้น 80–90 มม. หางยาว 85–95 มม. เป็นตุกแกขนาดกลาง หัวแบบ ลำตัว พองออกตอนกลาง หางยาวเรียว และมีปุ่มแหลมๆ เรียงขั้นรอบหางเป็นชุด นิ้วเท้าทั้งสองคู่ ยาวเรียว เกล็ดบนหัวแบบ เกล็ดลำตัวมีเกล็ดเล็กประปันกับเกล็ดใหญ่เป็นปุ่มนูน ขาทั้งสองคู่มีปุ่มปนมาก

ลำตัวสีน้ำตาลออกราด ประดับจุดสีเข้มทั่วตัว บริเวณหลังหัวมีแถบกว้างรูปสามเหลี่ยม ซึ่งมียอดชี้ไปทางด้านหลัง ลำตัวมีปีนรูปสามเหลี่ยมขอบหยัก 3 คู่ บางคู่มีแกนเชื่อมตอกันตรงกลางหลัง หางมีลายสีเข้มขั้นรอบ 11–12 ลาย ระหว่างลายขั้นใหญ่มีจุดสีคล้ำและเอี้ยดแทรกอยู่ประปราย

เขตแพร่กระจาย: มีเขตแพร่กระจายแคบบริเวณทิวเขาดงพญาเย็น เคยพบในจังหวัดสระบุรีและนครราชสีมาเท่านั้น

บริเวณป่าสารแกราชได้พบตุกแกชนิดนี้บ่อยกว่าที่อื่นๆ น่าจะเป็นบริเวณแหล่งอาศัยที่เหลืออยู่เพียงไม่กี่แห่ง

ที่อยู่อาศัย : พนอาศัยอยู่ในป่าดิบแล้งเท่านั้น บางครั้งพบหากินในบริเวณรอยต่อระหว่างป่าดิบแล้งกับป่าเต็งรัง โดยเฉพาะในเขตสถานีวิจัยฯ ตรงจุดใกล้กับเขื่อนล่าง จุดที่สำรวจพบ คือ ชุดเดียวกันมากเข้าไปในป่าดิบแล้ง และจุดป่าอยต่อใกล้กับเขื่อนล่าง

อุปนิสัย : หากินโดยเดี่ยวบนพื้นป่าดิบแล้ง คลานไปมา แล้วขึ้นเหยื่อพอกแมลงต่างๆ ที่เกาะบนใบไม้แห้ง และตามขอนไม้ล้มบนพื้นป่านานๆ จะพูดโตรีขึ้นไปบนก้อนหินเพื่อหาเหยื่อ ในคืนที่มีฝนตกพบเข็นมาเดินบนถนนไปสู่สามแยก ส่วนในเวลากลางวันชูกตัวนอนในขอนไม้ผู้เดือกขอนไม้ที่มีขนาดใหญ่ เส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 12–15 ซม. เข็นไป หรือซอกอยู่ใต้เปลือกของขอนไม้

สถานภาพ : จัดเป็นสัตว์ถิ่นเดียว พนเฉพาะในประเทศไทย (endemic species) ในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอกับภาคกลางทางด้านตะวันออก มีประชากรอยู่มาก เคยพบในเดือนพฤษภาคม และเดือนกรกฎาคม 2544 เพียงครั้งละ 1 ตัว เท่านั้น กฎหมายจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง



ຕູກແກປ່າດງພລາເຢືນ

Angular-spotted Gecko

Cyrtodactylus angularis (Smith, 1921)

Squamata