

๗ ตุ๊กแกป่าตะวันออก

ลักษณะ : ขนาดวัดจากปลายปากถึงก้น 48 – 60 มม. หางยาว 50 – 57 มม. ขนาดกลาง ลำตัวแบนค่อนข้างเรียวยาว หางเรียวยาวมักจะสั้นกว่าความยาวหัวกับลำตัวเล็กน้อย ผิวหนังมีเกล็ดละเอียดกับปุ่มปมประปรายทั่วลำตัว ขาทั้งสองคู่ยาว มีนิ้วเรียวยาวเห็นชัด ใต้ท้องมีเกล็ด 40 – 50 แถว

สีลำตัวออกน้ำตาลเทาหรือน้ำตาลคล้ำ มีแถบพาดขวางลำตัวกว้างเด่นชัด 4 แถบ มีสีเข้มกว่าสีพื้นและมีปุ่มปมสีขาว ๆ เรียงเป็นขอบ บริเวณด้านหลัง

หัวมีแถบดำคาด ซึ่งมีสาขายื่นไปข้างหน้าจนถึงลูกตา หางมีแถบสีคล้ายคาดเช่นเดียวกับลำตัว ส่วนใหญ่มีจำนวน 6-7 แถบ ด้านบนของหัวสีออกน้ำตาลเรียบ ไม่มีลายเหมือนตุ๊กแกชนิดอื่น ๆ

เขตแพร่กระจาย : มีเขตแพร่กระจายแคบๆ บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและบริเวณทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศไทย และบริเวณทิศตะวันตกของกัมพูชา

ในบริเวณป่าสะแกราช พบอาศัยในป่าดิบแล้งและบริเวณรอยต่อระหว่างป่าดิบแล้งกับป่าเต็งรัง สำรวจพบ 2 จุดหลัก คือ จุดบริเวณสามแยกในป่าดิบแล้ง และจุดบริเวณรอยต่อใกล้ลานจอดรถลิมโพร

ที่อยู่อาศัย : ในเวลากลางวันซุกซ่อนตัวนอนในกองไม้ผุบนพื้นป่า หรือใต้เปลือกขอนไม้ล้ม ออกหากินในเวลากลางคืน ตัวอาซุน้อยปีนไต่ไปหากินแมลงขนาดเล็กตามใบของพุ่มไม้เตี้ย ๆ สูงจากพื้นดิน ในขณะที่ตัวเต็มวัยเดินทางกินบนพื้นป่าและข้างถนนในป่าดิบแล้ง บริเวณที่อาศัยมักมีความรกทึบสูง และอยู่ไต่ริมเงาเรือนยอดที่มีแสงส่องลงไปถึงพื้นป่าน้อยมาก

อุปนิสัย : ออกหากินในเวลากลางคืนค่อนข้างดึก เคยพบในเวลา 22:00 น. จนถึง 24:00 น. เป็นส่วนใหญ่ ก่อนเวลานี้จะไม่ค่อยพบ ยกเว้นเป็นตัวที่มีอาซุน้อย ๆ ซึ่งจะออกหากินก่อนตัวเต็มวัย

เวลาตกใจจะคลานหนีอย่างรวดเร็ว แล้วหยุดนิ่งเพื่อการพรางตัว ไม่วิ่งหนีไปเรื่อย ๆ หากถูกรบกวนต่อไปอีกก็จะวิ่งหนีไปอีกระยะหนึ่งจึงหยุดเหมือนเช่นเดิม เวลาอยู่นิ่งบนพื้นป่าที่มีใบไม้แห้งเต็มไปหมด จะสังเกตเห็นได้ยาก ช่วงเวลาที่พบส่วนใหญ่ในฤดูฝน ตั้งแต่เดือนมีนาคมจนถึงเดือนกรกฎาคม

สถานภาพ : มีประชากรน้อยมากในเขตพื้นที่สระแกราช มีแนวโน้มที่จะสูญพันธุ์หมดไปจากบริเวณ
ได้
กฎหมายจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง



ตุ๊กแกป่าตะวันออก
(ชื่ออื่น : ตุ๊กแกป่าเมืองจันทร์)

Eastern Banded Gecko

Cyrtodactylus intermedius (Smith, 1917)

Squamata