

จิ้งจกหางแบน

ลักษณะ : ขนาดวัดจากปลายปากถึงก้น 53–57 มม. หางยาว 61–63 มม. ขนาดกลาง มีลำตัวค่อนข้างแบนราบ หัวแผ่กว้าง ปากสอบลงแหลมที่ปลาย หางแบนและพองโตออกตอนโคน เกือบบนหัวใหญ่กว่าเกล็ดบนลำตัว มีแผ่นหนังแบนๆ ยื่นออกทางด้านข้างลำตัวพาดตั้งแต่ด้านหลังของขาคู่หน้าถึงด้านหน้าของขาคู่หลัง นิ้วเท้าค่อนข้างสั้น แต่แผ่กว้าง และมีพังผืดยึดเชื่อมระหว่างนิ้ว ขอบหางทั้งสองข้างแผ่แบนออกมาและมักขาดออกเป็นริ้วเล็กๆ ตลอดหาง

สีลำตัวแปรผันมาก พบตั้งแต่สีออกเทาจางๆ สดคล้ายบนตัวไม้ขัดเงา จนถึงลำตัวสีออกคล้ำเกือบดำ มีลายแถมตรงแนวกึ่งกลางหลังสีเข้ม 3–4 จุด และยังมีลายขีดต่อเนื่องไปตามด้านสีข้างทั้งสองข้าง ขาทั้งสองคู่มียาลึกลับกว่าพาดขวางโดยตลอด เห็นชัดกว่าในขาคู่หลัง หางตอนปลายๆ เห็นเป็นลายแถบริ้วๆ พาดขวางชัดเจน แต่ตอนโคนสดคล้ายต่างๆ ค่อนข้างเลอะ


เขตแพร่กระจาย : มีการกระจายตั้งแต่ศรีลังกา อินเดีย ตลอดไปทางทิศเหนือถึงจีนตอนใต้ ลงไปทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จนถึงออสเตรเลีย

ในเขตพื้นที่ป่าสะแกราช ส่วนใหญ่พบในป่าดิบแล้งและในบริเวณรอยต่อระหว่างป่าดิบแล้งกับป่าเต็งรัง พบน้อยมากในบริเวณป่าปลูก การสำรวจไม่พบในป่าเต็งรังโล่งๆ เลย ปริมาณประชากรที่พบในป่าดิบแล้งค่อนข้างใกล้เคียงกันในฤดูแล้งกับฤดูฝน

ที่อยู่อาศัย : เกาะหากินและอาศัยอยู่ตามต้นไม้ขนาดใหญ่ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 ซม.ขึ้นไปเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะต้นไม้ที่มีเปลือกกร่อนจากลำต้นมากๆ พบเกาะหัวขึ้นหรือหัวชี้ลงดินบนลำต้นและใต้กิ่งขนาดใหญ่ ลำตัวมีสีออกเข้มและมีสดคล้ายเด่นชัด ดูคล้ายสีของเปลือกไม้ที่อาศัย ในป่าปลูกมักอยู่บนต้นกระถินณรงค์ที่ขึ้นต้นแห้งตาย มีเปลือกหลุดร่อนออกมามากๆ

อุปนิสัย : อาศัยอยู่เป็นที ไม่ค่อยย้ายแหล่งอาศัย พบอยู่ที่ใดที่หนึ่งเป็นเวลานานหลายเดือน คอยจ้องดูแมลงที่มาเกาะลำต้นไม้ แล้วรีบออกมาจับกิน ไม่ว่าจะอยู่ในเวลากลางวันหรือกลางคืน หนีภัยโดยการไต่ขึ้นสูงไปเรื่อยๆ บนลำต้นไม้ จนเกือบถึงส่วนยอด เป็นเวลานานราว 1–2 ชั่วโมง จึงค่อยๆ ไต่กลับลงมาอยู่ที่ระดับ 1.5 – 2 ม. จากพื้นดิน ซึ่งเป็นระดับอาศัยอยู่ปกติ

สถานภาพ : มีปริมาณประชากรค่อนข้างคงที่ ไม่เพิ่มหรือลดไปจากการแผ่ขยายมาตลอดปี



จิ้งจกหางแบน

Common Frilly Gecko

Cosymbotus platyurus (Schneider, 1792)

Squamata