

จิ้งจกหินสีจาง

ลักษณะ : ขนาดวัดจากปลายปากถึงก้น 54–58 มม. หางยาว 56–62 มม. ขนาดเล็ก ลำตัวค่อนข้างแบน หัวแบนใหญ่กว่าลำตัว หางยาวได้เกือบกับความยาวหัวกับลำตัว หางแผ่ออกตอนโคนแล้วเรียวยาวสู่ปลายหาง นิ้วเท้าอ้วนและสั้น และมีพังศียึดอยู่ระหว่างนิ้ว แต่พังศียึดหัวแม่เท้ากับนิ้วชี้ มีขนาดกว้างกว่าระหว่างช่วงนิ้วอื่นๆ ขอบหางด้านข้างมักมีริ้วละเอียด ดูคล้ายเป็นซี่หนังเล็กๆ ผิวหนังค่อนข้างบางและนิ่มขาดได้ง่าย

ลำตัวสีเทาน้ำตาลโดยตลอด บางตัวมีลายดวงกลมสีจางกว่าเรียงเป็นสองแถวตามแนวสันหลัง ไตกาง ลำตัวและใต้หางสีออกเหลือง มีจุดละเอียดสีดำกระจายเต็มไปหมด หัวมีสีคล้ำกว่าหลังเล็กน้อย แต่ข้างแก้มทั้งสองมีสีจางกว่าเด่นชัด

เขตแพร่กระจาย : มีเขตการกระจายกว้างขวางมาก พบตั้งแต่อินเดีย ศรีลังกา พม่า จีนตอนใต้ ทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ลงไปถึงออสเตรเลียและหมู่เกาะทะเลใต้ นอกจากนี้ยังมีการนำเข้าในประเทศเม็กซิโกอีกด้วย

ในบริเวณพื้นที่ป่าสะแกราช จิ้งจกหินอาศัยอยู่ส่วนใหญ่นอกอาคารบ้านเรือน มีเพียงโกดังเก็บของเพียงแห่งเดียวที่พบอาศัยอยู่ในบริเวณสถานีวิจัยฯ ส่วนใหญ่พบอาศัยอยู่ตามกองหิน หินโผล่ก้อนใหญ่ และตามเขื่อนกั้นน้ำ

ที่อยู่อาศัย : โดยทั่วไปพบในอาคารบ้านเรือนมากกว่าในสภาพป่า แต่ในบริเวณสะแกราช พบอยู่ในป่าดิบแล้งในจำนวนประชากรต่ำ เพียงจุดละ 2–3 ตัว หรือเพียงตัวเดียว เกาะหากินในเวลากลางคืนบนก้อนหินและกองหินที่อยู่บนพื้นป่า พบมากเป็นพิเศษที่เขื่อนกั้นน้ำเขื่อนบนและตามก้อนหินริมลำห้วย บางครั้งพบวิ่งหากินไปตามถนนลาดยางทั้งที่ตัดผ่านป่าดิบแล้งและป่าเต็งรัง กลุ่มที่พบหากินในโกดังเก็บของ มีเพียง 6–7 ตัว และเป็นชนิดนี้ชนิดเดียวเท่านั้น

อุปนิสัย : รักถิ่นอาศัย คงอยู่ในแหล่งอาศัยได้เป็นเวลานานๆ บางตัวพบได้เกือบทุกครั้งที่ส่องไฟสำรวจเวลามีแสงไฟส่อง มันจะวิ่งหลบไปด้านที่มีดเสมอ วิ่งไปมาไต่รวดเร็วๆ กว่าจิ้งจกชนิดอื่นๆ พวกที่หากินแมลงอยู่รอบๆ ดวงไฟ เวลาตกใจจะวิ่งหนีเข้าซอกแคบๆ หรือหนีออกจากแสงสว่างเข้าสู่บริเวณที่มีด บางครั้งหลบไปอยู่อีกมุมหนึ่งของฝาผนัง

สถานภาพ : มีประชากรคงที่ ไม่มีการเพิ่มขึ้นหรือลดลง ไม่ว่าจะเป็นในฤดูแล้งและฤดูฝน



จิ้งจกหินสี่ขา

Common Four-clawed Gecko

Gehyra mutilata (Weigmann, 1835)

Gekkonidae

Squamata