


กิ่งก้านปีกสม

- ลักษณะ :** ขนาดด้วดจากปลายปากถึงก้น 60–65 มม. หางยาว 93–110 มม. กิ่งก้านบินขนาดเล็ก ลำตัวเรียวยาว หางยาวกว่าลำตัว หัวมีขนาดเล็ก ใต้คางมีแผ่นหนังคุ้นรูปกลมมนอยู่สองข้างลำคอ และตรงกึ่งกลางระหว่างแผ่นหนังคุ้นมีแผ่นหนังรูปไขว้ยันหนึ่ง ซึ่งสามารถยกขึ้นลงได้ และมีขนาดโตชัดเจนในตัวผู้ ข้างลำตัวระหว่างขาคุ้นห้ากับขาคุ้นหลัง มีแผ่นหนังแผ่นอกไปด้านข้าง ลำตัวสีออกน้ำตาลแดง มีลายประสีคล้ำ ดูคล้ายเปลือกไม้ แผ่นปีกคานของสีออกส้ม และมีลายพาดตามยาวสีขาวๆ ใต้ท้องสีน้ำตาลอ่อนกว่า และใต้แผ่นปีกมีจุดกลมๆ สีดำ 1–2 จุด ตั้งแต่แก้วนอัสสัมด้านทิศตะวันออกเฉียงหนึ่งของอินเดีย ถึงจีนตอนใต้ เกาลี ไหหลำ เวียดนาม ลาว กัมพูชา ลงไปถึงภาคใต้ของไทย และตอนเหนือของมาเลเซีย
ในบริเวณป่าสักแกราช พนกิ่งก้านชนิดนี้ได้ในทุกสภาพป่า ส่วนใหญ่พบในช่องว่างในป่าดิบแล้ง ป่าเต็งรัง บริเวณรอยต่อระหว่างป่าดิบแล้งกับป่าเต็งรัง ยกเว้นไม่พบในป่าปุก จุดที่เกยบพนกได้แก่ บริเวณโภคสามแยก และโภคหอยในป่าดิบแล้ง บริเวณรอบบ้านพักและอาคารต่างๆ และบริเวณ สันพะยอมในป่าเต็งรัง
- ที่อยู่อาศัย :** อาศัยอยู่ตัวเดียวหรือเป็นคู่ตามเปลือกไม้บนดิน ไม้ขنากกลางลึกลึกลงไปในดิน ที่ดินอยู่รอบช่องว่างในป่า หรือริมถนน และรอบอาคารบ้านเรือน เกาะจะดูที่ติดกับป่า มีการร่อนจากแนวป่ามาข้างต้นไม้ที่ขึ้นอยู่รอบๆ อาคารบ้านเรือน ปกติชอบอยู่เคียงเคียงกับไม้ที่มีเปลือกเรียบหรือก้อนหางเรียบ เช่น อ้อยช้าง ไทร มะกอก เป็นต้น
- อุปนิสัย :** มินสักษารากินบนลำต้นไม้ที่แตกต่างกันไปในแต่ละช่วงเวลาของวัน ในตอนเช้ามืดและตอนพลบค่ำ กิ่งก้านจะได้ไปซ่อนตัวอยู่สูงในพุ่มใบและเกาะอยู่นิ่งๆ เคลื่อนไหวน้อยมาก เมื่อแดดร้อนแสงแดดที่จุดนีนานเพียงพอที่จะเคลื่อนที่ได้ เวลากลางวันจะได้ขึ้นลงลำต้นและร่อนไปมาในบริเวณต้นไม้ 3–5 ต้น
ตัวเมียลงมาบุคคลมุงวางไข่บนพื้นดิน มักบุคคลรุจุที่มีแสงแดดส่องลึกลึกลงและอยู่ในชอกพูพอนของต้นไม้ที่อาศัย วางไข่ 3–5 ฟอง ในถุงฟัน
- สถานภาพ :** มีปริมาณประชากรน้อยมากในบริเวณป่าสักแกราช พนในปริมาณ 1–2 ตัวต่อบริเวณ เช่น จำนวนที่เห็นจริงจะมีมากกว่าที่พบจากการสำรวจ เพราะมีการพรางตัวบันเปลือกไม้ได้ดี กฎหมายจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง



กิ้งก่าบินปีกส้ม

(ชื่ออื่น : กะปอมปีก)

Orange-winged Flying Lizard

Draco maculatus (Gray, 1851)

Agamidae

Squamata