

กิ่งกาห้วสีฟ้า

ลักษณะ : ขนาดวัดจากปลายปากถึงก้น 110–130 มม. หางยาว 225–268 มม. มีขนาดค่อนข้างใหญ่ มีหัวโต มีหนามสั้นๆ ตามแนวกึ่งกลางหลังจนตลอดสันหาง ขาทั้งสองคู่เรียวยาวและมีนิ้วเรียวยาวมาก หางมีความยาวประมาณสองเท่าของความยาวหัวกับลำตัว เกือบบนลำตัวขึ้นไปทางด้านหลังและชี้ขึ้นด้านบน ที่หัวไหล่มีร่องเป็นรอยพับลึกต่ำ

ในฤดูผสมพันธุ์ตัวผู้มีสีออกฟ้าคราม ตัดกับริมฝีปากสีขาว แถบขาวนี้ต่อเนื่องไปทางด้านข้างหัว และไปเชื่อมกับลายจุดสีน้ำตาลแดง เป็นรูปปื้นกลม ๆ ข้างละ 3 ปื้น บริเวณโคนหางหลังและโคนหางสีออกขาว ตัวเมียสีออกน้ำตาลคล้ำทั่วทั้งตัว ใต้คางและคอสีคล้ำเกือบดำ ใต้ท้องสีออกเขียวจาง ๆ และได้หางตอนโคนสีออกขาว

เขตแพร่กระจาย : มีเขตแพร่กระจายแคบในประเทศพม่าตอนกลางลงไปถึงตอนใต้ ไทย เวียดนาม ลาว กัมพูชา ในประเทศไทยพบลงไปแค่ระดับคอคอดกระ

ในบริเวณป่าสะแกราช พบอยู่ตลอดปีในป่าเต็งรังในปริมาณไม่ชุกชุม ในฤดูแล้งช่วงเดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนมกราคม อาศัยอยู่เฉพาะในบริเวณที่ร่มครึ้มในป่าเต็งรัง หลังจากมีฝนตกชุก จะแผ่เข้าไปหากินและวางไข่ในบริเวณรอยต่อระหว่างป่าเต็งรังกับป่าดิบแล้งและต่อไปเข้าไปในป่าดิบแล้ง รวมทั้งในแปลงป่าปลูกที่อยู่ติดกับป่าเต็งรัง ในฤดูฝนพบมีปริมาณชุกชุมมากในป่าเต็งรัง

ที่อยู่อาศัย : โดยธรรมชาติเกาะอยู่บนลำต้นไม้ขนาดใหญ่ในป่าเต็งรังที่มีพุ่มใบหนาทึบ มีร่มเงาอยู่โดยรอบ และได้รับแสงแดดทั้งในตอนเช้าและตอนบ่าย ดากแดดโดยมักเกาะเอาหัวลงตรงลำต้นด้านที่แสงแดดส่องมากระทบ ไม่ค่อยลงมาพื้นดิน ยกเว้นพวกตัวเมียลงมาขุดหลุมวางไข่ ตัวผู้มีชอบเขตอาศัยบนต้นไม้ต้นหนึ่ง และอาจแผ่คลุมถึงต้นไม้อีก 2–3 ต้นในบริเวณเดียวกัน ตัวเมียอยู่ตามขอบของอาณาเขตของตัวผู้ หรืออยู่ในบริเวณเดียวกับตัวผู้

ลูก ๆ อาศัยอยู่ตามพุ่มไม้ทึบ ๆ หรือในคงหญ้าเพ็ก เมื่อมีอายุมากขึ้น จึงมาเกาะอยู่ตามลำต้นของต้นไม้ขนาดปานกลาง ห่างจากต้นไม้ใหญ่ที่มีตัวผู้เฝ้าระวังอยู่

อุปนิสัย : ใช้ชีวิตส่วนใหญ่ได้ไปมาขึ้นลงลำต้นต้นไม้ หากินแมลงหรือสัตว์เล็กๆ ที่มาเกาะบนเปลือกหรือไต่ขึ้นมาจากพื้นดิน ตัวผู้จะผงหัวขึ้นลงเป็นครั้งคราว ตัวเมียขุดหลุมวางไข่บนถนนลูกรังของแนวกันไฟ โดยขุดหลุมลึก 7 ซม. กว้าง 5 ซม. วางไข่ขนาดยาว 15 มม. กว้าง 8 มม. จำนวน 8 ฟองไว้ในหลุม หลังจาก

วางไข่เสร็จแล้ว ตัวแม่จะนอนคอยเฝ้าอยู่ใกล้ ๆ หลุมไข่

สถานภาพ : มีประชากรชุกชุมในป่าเต็งรัง ต่างจากกิ้งก่าแก้วที่มีชุกชุมในป่าดิบแล้ง ในฤดูฝนจะแผ่เข้าไปหาหินและวางไข่ในป่าแบบอื่น ๆ ที่อยู่ใกล้เคียงกัน
กฎหมายจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง



กิ้งก่าหัวสีฟ้า

(ชื่ออื่น : กิ้งก่าสวน, กะปอมก่า)

Blue Crested Lizard

Calotes mystaceus (Dumeril & Bibron, 1837)

Squamata