

## กิจกรรม

**ลักษณะ :** ขนาดวัดจากปลายปากถึงก้น 85–98 มม. หางยาว 240–243 มม. ขนาดกลาง ลำตัวยาว หางยาวมากกว่าสองเทาของความยาวหัวกับลำตัว บนหัวมีเกล็ดขนาดใหญ่เรียงกันอย่างไม่เป็นระเบียบ เกล็ดลำตัวมีปลายซึ่งไปทางด้านหลังและด้านบน สันหลังมีเกล็ดเป็นหนามแหลมพัดยาวคลอต ไปจนถึงโคนหาง ขาและนิ้วค่อนข้างยาว โดยเฉพาะขาคุ้งจะยาวกว่าขาคุ้นมาก

ลำตัว胖มีสีได้หลากหลาย มีน้ำตาลออกรสีขาว น้ำตาลอ่อน หรือบางครั้งสีน้ำตาลออกรสีแดง ในฤดูฝนพันธุ์ตัวผู้จะมีลำตัวสีอ่อนชมพูอมสีเหลืองและมีแถบสีดำบนหน้าคุ้กคายใส่หน้ากากสีดำ ใต้ท้องสีน้ำตาลออกรสีเหลือง ใต้คอสีคล้ำมีประดับด้วยจุดสีส้มจางๆ ลำตัวมีแถบพัดขาวสีดำ 6 แถบ หางมีแถบพัดขาว 12–13 แถบ ตามมีแถบพัดขาวสีจางๆ ใต้ท้องสีอ่อนเทาและบางบริเวณมีประสีเหลืองด้วย

**เขตแพร่กระจาย :** มีการกระจายตัวแต่ในแคว้นอัสสัมของอินเดีย ไปยัง ไทย ลาว เวียดนาม กัมพูชา จีนตอนใต้ ลงไปถึงมาเลเซีย

ในเขตป่าดิบแล้งตลอดทั้งปี จำนวนที่พบจะสูงขึ้นในฤดูฝนตอกชูกา และจะขยายแหล่งหากินออกไปสู่ป่าเต็งรังและป่าลูกเฉพาะในช่วงฤดูฝนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนมิถุนายน บริเวณรอบสถานีฯ พันธุ์มาก ที่พบมากเป็นตัวอย่างอยู่ส่วนใหญ่พบแกะออยตามพุ่มไม้ริมถนนลาดยางที่ผ่านป่าดิบแล้ง มักอยู่ในระดับความสูง 1.5–2 ม. จากพื้นดิน ในป่าเต็งรังพบได้ไปมานด้วยไม้ใหญ่ตอนโคนและบนพื้นดิน ซึ่งเป็นฤดูฝนพันธุ์รุ่งเรือง บริเวณที่วางไข่นี้ยังพบไปจนถึงแปลงป่าลูกที่ค่อนข้างทึบอีกด้วย เห็นได้บ่อยๆ เกาะบนต้นกระถินรองราก

**อุปนิสัย :** ในเวลาเช้าเมื่อมีแสงแดดร่องไปบนพื้นป่า กิจกิจภัยจะออกมากากกิ่งไม้ โล่งๆ เพื่ออาบแดด เป็นเวลานานๆ บางตัวจะตากแดดอยู่นานถึง 1.5 ชั่วโมง ส่วนใหญ่ใช้เวลา 45 นาที จนถึง 1 ชั่วโมง และวิ่งໄต่ไปหากินในบริเวณอื่นๆ ลูกๆ ใช้เวลาอาบแดดร่องไม่เกิน 30 นาที และໄต่กิ่งไม้เดียว เช่น หญ้าพืช อกไม้ตากแดดก่อนตัวเดินวิ่ง

ในช่วงฤดูฝน ตามริมถนนลาดยางตั้งแต่บริเวณสถานีวิจัยฯ ขึ้นไปจนถึงสามแยก จะพบมีแต่กิจกิจตัวเดียวเท่านั้น ไม่พบลูกกิจกิจภัย เช่น เป็นตุ๊ก ผสมพันธุ์ ตัวเดียววิ่งออกมายังกลุ่มกันตามแนวถนน ในขณะที่ลูกๆ หาอาหารจากถนนออกไป

สถานภาพ : ยังพบมีชุมชนทั่วบริเวณ โดยเฉพาะในป่าดิบแล้ง ในช่วงที่มีฝนตกชุกมากๆ กฎหมายจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง



## ๊กิ๊กกาแก้ว

### Forest Crested Lizard

*Calotes emma* (Gray, 1845)

Squamata