

กิ่งก้านอยหางยาว

ลักษณะ : ขนาดวัดจากปลายปากถึงก้น 38 มม. หางยาว 76 มม. ขนาดเล็ก หัวยาวเรียว และมีหางยาวกว่า ลำตัวมาก ด้านหลังคอและแผ่นหลังปกคลุมด้วยเกล็ดรูป สี่เหลี่ยมผืนผ้าเรียงต่อกันตามแนว กว้างไปจนถึงโคนหาง เกล็ดใต้ท้องเป็นสันชัดเจนมีจำนวน 10–14 แถว เกล็ดทวารมีเกล็ด เดียวขนาดใหญ่และอีกสองเกล็ดเล็กกว่าอยู่ทางด้านข้างทั้งสองข้าง รวมเป็น 5 เกล็ด

ลำตัวสีน้ำตาลเหลือง สีก้นกว่าบนหัวและแผ่นหลัง หางสีน้ำตาลอ่อนมาก ใต้ท้องสี ออกขาว ไม่พบมีจุดอื่นใดบนลำตัวและหาง

เขตแพร่กระจาย : มีการกระจายตั้งแต่จีนตอนใต้ เกาะไหหลำ ลงมาตลอดทั่วพม่า ไทย ลาว เวียดนาม กัมพูชา ลงไปถึงบริเวณภาคเหนือของมาเลเซีย

ในบริเวณป่าสะแกราช พบเพียง 1 ตัว เป็นลูกอายุอ่อนอยู่ในบริเวณพงหญ้าในเขตรอยต่อ ระหว่างป่าดิบแล้งกับป่าเต็งรังด้านหลังของสถานีวิจัยฯ บนเส้นทางเดินไปสู่ น้ำตกและถ้ำหิน เจียว เชื่อว่าน่าจะมีจำนวนประชากรในป่าเต็งรังสูงกว่านี้

ที่อยู่อาศัย : วังไปมาอยู่ได้พงหญ้าที่เบา ขึ้นมาหากินบนยอดคงหญ้าในเวลาเช้า ช่วงนี้จะมาเกาะอยู่บนยอด หญ้า หรือบนใบหญ้า ลักษณะการเกาะ คือ ตัวอยู่บนใบหญ้าใบหนึ่ง แล้วทอดหางให้พาดไป บนใบหญ้าใกล้เคียงอีก 2–3 ใบ เวลาหากินชอบกอดหญ้าที่อยู่ในที่โล่งแจ้ง มีแสงแดดส่องถึง โดยตลอด

อุปนิสัย : ออกหากินตลอดวัน ในช่วงเช้าก่อนแสงแดดออก จะขึ้นไปเกาะอยู่บนใบหญ้าสูงเพื่ออาบแดด และหากินไปเรื่อยๆ ตามยอดหญ้า โดยเฉพาะในช่องว่างในป่าเต็งรัง พอแสงแดดเริ่มแรงกล้า ขึ้นจะหลบลงไปใต้กอหญ้า รอนิ่งๆ เพื่อได้ขึ้นไปหากินอีกในช่วงบ่าย พอตกเย็นจะย้าย ไปอยู่ตามพงหญ้าที่มีร่มเงาของไม้ใหญ่ พักนอนบนใบหญ้าบริเวณกลางๆ พุ่ม ไม่ไช้บนยอด ใบเหมือนเวลาหาอาหาร

ขณะหากินหรืออาบแดด เมื่อถูกรบกวนจะพุ่งตัวลงซ่อนในกอหญ้าที่อยู่ด้านล่าง แล้วมุด หนีไปจากจุดนั้นประมาณ 1–2 ม. และซ่อนตัวอยู่ที่นั่น พร้อมทั้งจะมุดหนีต่อไปอีกครั้งละ 1–2 ม.

สถานภาพ : หายากมาก พบเพียงตัวอายุอ่อนตัวเดียว เชื่อว่าน่าจะมีจำนวนประชากรสูงกว่านี้อีกมาก



กิ้งก้านอยหางยาว

(ชื่ออื่น : จิ้งเหลนน้อยหางยาว, งูคา)

Long-tailed Lizard

Takydromus sexlineatus (Daudin, 1802)

Varanidae

Squamata