

จิงเหลนเรียวทองเหลือง

ลักษณะ : ขนาดวัดจากปลายปากถึงก้น 40–45 มม. หางยาว 51–55 มม. ขนาดเล็ก ลำตัวค่อนข้างกลม ขาทั้งสองคู่เรียวก่อนสังเกตเห็นได้ยาก หัวแบนราบปลายแหลม หางกว้างแต่แบนราบ สัดส่วนวัดจากปลายปากถึงขาหน้าเท่ากับ 60% ของระยะจากขาหน้าถึงขาหลัง แถวเกล็ดรอบลำตัว 28–30 แถว หางยาวกว่าลำตัวประมาณ 20% เกล็ดลำตัวเรียบหรือบางครั้งมีสันไม่ชัด

ลำตัวมีสีน้ำตาลเหลืองถึงน้ำตาลคล้ำ แผ่นหลังด้านข้างมีลายสีจางกว่าคู่หนึ่ง เริ่มจากด้านหลังตาไปจนสุดตะโพก ด้านข้างสีคล้ำ มีลายจุดสีดำกระจายไปทั่ว ด้านหลังระหว่างแถบลายสีจาง มีลายขีดสีดำตามยาว 5–6 แถว ลายขีดเหล่านี้จะชัดเจนที่สุดตรงด้านหลังหัวแล้วค่อยๆ จางไปเรื่อยๆ ได้ทองสีออกขาวอมเหลือง ในฤดูผสมพันธุ์ โดยเฉพาะตัวผู้มีสีส้มแซมทางด้านข้าง ลำตัว และได้ทองสีเหลืองสด

เขตแพร่กระจาย : พบตั้งแต่ฮ่องกง จีนตอนใต้ พม่า เวียดนาม ลาว กัมพูชา มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ (เกาะปาลาวัน) ตลอดไปทั่วถึงออสเตรเลีย

ที่อยู่อาศัย : ในบริเวณพื้นที่ป่าสะแกราช ในฤดูแล้งส่วนใหญ่จะอยู่ในป่าดิบแล้ง ซึ่งพบมีความชุกชุมสูงมาก ส่วนในป่าเต็งรังและบริเวณรอยต่อระหว่างป่าดิบแล้งกับป่าเต็งรังมีประชากรน้อย พบเพียง 2–3 ตัว ในฤดูฝนปริมาณตัวจะใกล้เคียงกันในพื้นที่ป่าดิบแล้ง ป่าเต็งรัง และรอบ ๆ สถานีวิจัยฯ แต่มีแนวโน้มพบมากขึ้นในป่าเต็งรัง ในเดือนกันยายนพบมีลูกอาศัยอยู่รวมในแหล่งอาศัยด้วย ตัวเต็มวัยอยู่เป็นคู่ๆ ตามใต้ก้อนหินและขอนไม้ๆ ในป่าเต็งรัง และชุกตัวในพุ่มและรอบโคนต้นไม้ใหญ่ในป่าดิบแล้งและป่าในบริเวณรอยต่อ ตัวอายุน้อยและตัวอ่อนอยู่โดดเดี่ยวหรืออยู่รวมกัน 3–4 ตัว ในบริเวณเดียวกัน อาจเป็นหลุมที่มีใบไม้แห้งทับถมหนา ใต้ก้อนหินขนาดเล็ก และได้ขอนไม้บนพื้นป่า

อุปนิสัย : ล่าเหยื่อต่างๆ ได้ชั้นใบไม้แห้งบนพื้นป่า มักไม่ค่อยจะเห็นตัว เห็นเป็นเพียงใบไม้ขยับไปมาเป็นทางๆ แต่จะไม่ออกไปไกลจากรูหรือโพรงที่อาศัยมากนัก เท่าที่พบอยู่ในระยะระยะมี 2–3 ม. จากรูอาศัย

เวลาพบเมื่อพลิกก้อนหินหรือขอนไม้ขึ้นมา บางตัวจะหยุดนิ่งชั่วระยะหนึ่ง ก่อนวิ่งไปมุดลงในดินที่ใกล้ที่สุด บางตัวมุดลงในรูลึกที่ขุดไว้ใต้ก้อนหิน บางตัวมุดไปได้ใบไม้แห้งที่อยู่รอบๆ หรือหนีไปซุกซ่อนอยู่นานประมาณครึ่งชั่วโมง แล้วค่อยๆ กลับมาที่รูอาศัยดั้งเดิม

ฤดูผสมพันธุ์อยู่ในช่วงฤดูฝนเหมือนจิ้งเหลนชนิดอื่นๆ เพียงแต่มีระยะเวลานานกว่า
เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมจนถึงเดือนกันยายน

สถานภาพ : พบทุกชุมทั่วไปในทุกสภาพป่า แต่พบน้อยมากในป่าปลูก ประชากรยังมีชุมในบริเวณ



จิ้งเหลนเรียวทองเหลือง

Bowring's Slender Skink

Riopa bowringii (Gunther, 1864)

Scincidae

Squamata