


จิ้งเหลนริ้วขาวเล็ก

- ลักษณะ :** ขนาดวัดจากปลายปากถึงก้น 25 มม. หางยาว 33 มม. (ตัวที่โตเต็มที่จะมีขนาดวัดจากปลายปากถึงก้น 59–68 มม. หางยาว 68–72 มม.) เป็นจิ้งเหลนขนาดเล็ก ลำตัวเรียวยาวมาก แบนราบ ขาทั้งสองคู่มีขนาดเล็กจนแทบไม่เห็น และตั้งอยู่ห่างกันมาก ระยะระหว่างปลายปากถึงขาหน้ามีความยาวเป็น 20% ของระยะระหว่างขาหน้าจนถึงขาหลัง หัวมีลักษณะแบนราบและปลายหัวรูเปิดของหูเล็กมากและถูกเกล็ดคลุมไปบางส่วน แฉกเกล็ดรอบตัวตรงกึ่งกลางของลำตัว 24–26 แฉก ใต้ผิวหนัง ซึ่งเป็นนิ้วที่ยาวที่สุดมีเกล็ด 5 เกล็ด
- ลำตัวสีน้ำตาลคล้ำเกือบดำ มีลายขีดสีคล้ำกว่าพอเห็นได้ตามยาวของ ลำตัว 8 ลาย ตามแนวแนวของเกล็ดหลังจนตลอดความยาวของหาง สีข้างและใต้ท้องสีออกจางกว่า เกล็ดริมฝีปากสีคล้ำกว่าบริเวณอื่นๆ ของหัว
- เขตแพร่กระจาย :** มีการกระจายทางเหนือตั้งแต่จีนตอนใต้ พม่า เวียดนาม ลาว กัมพูชา ไทย ลงมาถึงมาเลเซีย เกาะปาลาวัน และไปตลอดหมู่เกาะอินโดนีเซียจนถึงออสเตรเลีย ในเขตพื้นที่ศึกษาได้สำรวจพบเพียง 1 ตัว เป็นตัวอ่อนที่ยังมีสีคล้ำอยู่ โดยขุดได้ในพุ่มต้นตะเคียนหินขนาดใหญ่ในป่าดิบแล้งใกล้หอคอย ในเดือนพฤศจิกายน 2543
- ที่อยู่อาศัย :** ซ่อนตัวซุกอยู่ใต้ดินชิดกับแนวโคนต้นตะเคียนหินในป่าดิบแล้ง อยู่ลึกจากผิวดินประมาณ 5 ซม. ดินในบริเวณตอนบนเป็นพกรากฝอยหนาแน่น ไต่ลงไปเป็นดินร่วนทรายละเอียด เหมาะต่อการอยู่อาศัย เชื่อว่าตัวเต็มวัยน่าจะอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมเฉพาะเหมือนกัน
- อุปนิสัย :** ยังไม่ทราบรายละเอียดมากนัก เพราะพบเพียงตัวเดียว โดยขุดได้จากใต้ดินโคนต้นไม้ เวลาถูกขุดขึ้นมา จะคลานคล้ายเลื้อยอยู่บนผิวดินสักครู่หนึ่ง ประมาณ 10–15 วินาที ก่อนจะพยายามมุดกลับลงไปในดิน
- ในบริเวณป่าสะแกราช ยังไม่เคยพบขึ้นมาเลื้อยอยู่บนถนน ดังเช่นที่เคยพบในบริเวณอื่นๆ
- สถานภาพ :** น่าจะหายาก มีปริมาณในธรรมชาติน้อย แต่อาจจะประเมินต่ำไปก็ได้ เพราะเป็นจิ้งเหลนที่ซุกซ่อนตัวโดยธรรมชาติ



จิ้งเหลนเรียวขาเล็ก

(ชื่ออื่น : เมียงู)

Common Slender Skink

Lygosoma quadrupes (Linnaeus, 1766)

Scincidae

Squamata