

งูลายสาบคอแดง

ลักษณะ : ขนาดวัดจากปลายปากถึงก้น 380–450 มม. หางยาว 152–174 มม. เป็นงูหากินบนพื้นดินขนาดปานกลาง หัวมีคอคอดลงเห็นได้ชัดเจนจากส่วนลำตัว และมีรูปทรงค่อนข้างแบนทางด้านบน ลูกตาโตเห็นได้ชัดเจนทางด้านข้าง ลำตัวไม่ยาวเรียว หางค่อนข้างสั้น เกือบลำตัวมีสัน โดยเฉพาะทางด้านแนวสันหลัง ใต้ท้องมีเกล็ดที่มีสันไม่ชัด

ลำตัวสีออกน้ำตาลเขียวหรือเขียวคล้ำ ๆ หัวสีเขียวคล้ำเกือบดำ เกล็ดบนหัวและเกล็ดริมฝีปากมีร่อง เกล็ดสีด้านบนลำตัวมีปลายของเกล็ดแต่ละเกล็ดสีคล้ำ ทำให้มีลายดูเหมือนลายตาข่ายสีคล้ำปกคลุมทั่วแผ่นหลัง และลายถี่มาก

บนส่วนหาง เกล็ดใต้ท้องสีขาวออกเหลือง ลักษณะเด่น คือ ผิวหนังระหว่างเกล็ดบริเวณด้านหลังลำคอสีแดงสด เห็นได้ชัดเจนมากเวลาโกรธ ซึ่งมันจะแผ่กางเกล็ดออกโดยการพองลำคอให้กว้างกว่าขนาดปกติ แถวเกล็ดที่กึ่งกลาง ลำตัว 19 แถว

เขตแพร่กระจาย : มีเขตการกระจายกว้างขวางตั้งแต่อินเดียตอนเหนือ ไปถึงจีนตอนใต้ เกาะไหหลำ พม่า ไทย เวียดนาม ลาว กัมพูชา ถึงมาเลเซีย และอินโดนีเซีย (เกาะชวา เกาะบอร์เนียว และเกาะสุมาตรา)

ในบริเวณป่าสะแกราช พบชุกชุมในเขตป่าดิบแล้ง และบริเวณรอยต่อระหว่างป่าดิบแล้งกับป่าเต็งรัง ป่าปลูกที่มีลำห้วยไหลผ่านก็่นจะมีอาศัยอยู่บ้าง ในฤดูฝนพบมีลูกงูวัยรุ่นที่มีความยาวลำตัวและหาง 20–30 ซม. เลื้อยอยู่บนพื้นป่าดิบแล้งจำนวนมาก โดยเฉพาะในบริเวณสองข้างถนนลาดยาง ขึ้นไปถึงสามแยก และบริเวณหลังศาลเจ้าพ่อหลวงราช ต่อเนื่องไปถึงน้ำตกหลังสถานีวิจัยฯ

ที่อยู่อาศัย : ปกติพบอยู่ในป่าดิบชื้นที่มีลำห้วยไหลผ่าน และบริเวณรอยต่อของป่าที่มีชั้นใบไม้หนาและต้นไม้ร่มครึ้ม ภูเขาเล็กชุกคั่นนอนในพุ่มของต้นไม้ใหญ่และในกองใบไม้หรือกองกิ่งไม้ ภูเขาใหญ่ชุกคั่นตามซอกหินเล็กๆ ริมลำห้วย ในป่าเต็งรังอาศัยอยู่ริมหรือในลำห้วยแห้งๆ ที่มีใบไม้ตกลงไปทับถมหนาๆ

อุปนิสัย : พบหากินในเวลากลางวัน เฉพาะในวันที่มีฝนตกในตอนเช้าหรือตอนบ่าย เริ่มออกในขณะที่ฝนยังตกพริ้วๆ อยู่ เลื้อยหากินไปตามพื้นป่า เสาหักบงเหี่ยวเล็กๆ และแมลงบางชนิดที่ออกหากินเมื่อมีฝนตก ภูเขาใหญ่เลื้อยหากินไปตามซอกหินในลำห้วยและตามริมห้วย เวลาตกใจจะหยุดนิ่งเป็นเวลานาน แล้วชูหัวยกสูงจากพื้นดินประมาณ 15–20 ซม. หันหัวดูไปรอบๆ ก่อนลดหัวลงสู่พื้นแล้วเลื้อยต่อไป หากถูกจับจะแผ่เกล็ดบริเวณลำคอแบนออกมาจนสังเกตเห็น

เห็นสีแดงของผิวหนังชัดเจน ในขณะที่เดียวกันก็ปล่อยกลิ่นฉุนๆ ออกทางก้น ซึ่ง
เป็นวิธีการป้องกันตัว เพื่อขับไล่ศัตรูวิธีหนึ่ง

สถานภาพ : มีประชากรชุกชุมในบริเวณป่าสะแกราช โดยเฉพาะภูเขาขุน้อย พบเลื้อยหากินอยู่ทั่วไปใน
ฤดูฝน



งูลายสาบคอแดง

(ชื่ออื่น : งูคอหมากพริก, งูดางแห)

Red-necked Keelback

Rhabdophis subminiatus (Schlegel, 1837)

Colubridae

Squamata