

งูสิงบาน

- ลักษณะ :** ขนาดวัดจากปลายปากถึงก้น 954–1,012 มม. หางยาว 392–443 มม. เป็นงูหากินบนพื้นดินที่มีขนาดใหญ่และมีลำตัวและหางยาวเรียวสมตัว หัวค่อนข้างโต ลูกตาโตกลมเห็นได้ชัดเจนโดยตลอด ส่วนคอคอดเล็กน้อย ลำตัวมีเกล็ดเรียบหรือมีสันจาง ๆ ตรงท้ายทอยและโคนหาง เกล็ดเป็นมันวาวตลอดตัวมีจำนวนแถวเกล็ด 16 แถว เกล็ดใต้ท้องขยายใหญ่กว่างูชนิดอื่น ๆ
- ลำตัวสีออกน้ำตาลคล้ำถึงน้ำตาลออกเหลือง ขึ้นอยู่กับอายุของงู หัวสีคล้ำกว่า และเกล็ดขอบปากสีออกจางกว่าบริเวณอื่นๆ สีน้ำตาลบนลำตัวด้านหลังจะค่อยๆ คล้ำไปสู่ปลายหาง เกล็ดใต้ท้องสีขาวออกเหลือง หากสังเกตใกล้ๆ จะพบว่าแต่ละเกล็ดมีจุดสีคล้ำๆ ตอนปลายเกล็ด ซึ่งอาจจะเรียงต่อกันเป็นลายเล็กๆ ขวางลำตัว โดยเฉพาะบริเวณส่วนหางจะชัดเจนที่สุด
- เขตแพร่กระจาย :** อินเดียถึงจีนตอนใต้ เกาะไหหลำ ส่องกง ไต้หวัน เวียดนาม พม่า ลาว กัมพูชา มาเลเซียลงไปถึงอินโดนีเซีย (เกาะบอร์เนียว เกาะสุมาตรา เกาะชวา และเกาะบาหลี)
- ในเขตพื้นที่ศึกษาป่าสะแกราช พบได้บ่อยๆ ในทุกสภาพป่า พบชุกชุมที่สุดในป่าดิบแล้ง รองลงมาในบริเวณรอยต่อระหว่างป่าดิบแล้งกับป่าเต็งรัง โดยเฉพาะบริเวณสถานีวิจัย ฯ ด้านติดกับน้ำตกและถ้ำหินเขียว พบน้อยลงมาในป่าเต็งรัง และพบน้อยที่สุดในป่ากระถินณรงค์ ซึ่งเป็นป่าปลูก บริเวณที่พบบ่อย คือ ริมเขื่อนบนและถ้ำหินเขียว
- ที่อยู่อาศัย :** อาศัยอยู่ทั้งในบริเวณบ้านเรือนและในป่าธรรมชาติ ชุกตัวนอนในโพรงดิน จอมปลวก ใต้ถุนบ้านและอาคาร ใต้วัสดุต่างๆ ที่กองอยู่บนพื้นดิน ในป่าธรรมชาติมักทอดตัวพาดนอนอยู่บนก้อนหินขนาดใหญ่ ในพุ่มไม้รกที่บริเวณลำห้วย และพุ่มไม้ริมถนนลาดยางและแนวกันไฟ บริเวณที่พบบ่อยที่สุด คือบนก้อนหินริมลำห้วยในที่มีร่มเงาครีမ်
- อุปนิสัย :** ออกล่าเหยื่อบนพื้นดิน เลื้อยไต่รวดเร็วมาก มักตามกลิ่นของพวกหนูต่างๆ เช่น หนูฟัน (*Maxomys surifer*) และหนูทองขาว (*Rattus rattus*) เหยื่อชนิดแรกตามไปตามทางผ่านที่หนูวิ่งหากินไปมาได้ไม่พ้นล่างในป่าดิบแล้ง และเหยื่อชนิดหลังบริเวณรอบอาคารบ้านเรือนในเขตสถานีวิจัยฯ บางครั้งตามเข้ามาถึงในบ้านหรือในครัว การล่าใช้วิธีตามกลิ่น เมื่อใกล้ตัวจะใช้สายตามองหาแล้วเลื้อยไล่จนจับทันที่ส่วนใดส่วนหนึ่ง มันจะรีบใช้ลำตัวขูดเพื่อกันไม่ให้หนูมีโอกาสดูดอบ และรัดจนกระทั่งหนูขาดใจตายเพราะขาดอากาศหายใจ ก่อนจะกลืนกินโดยเอาหัวหนูเข้าก่อน

งูอายุน้อย ยังมีขนาดเล็กอยู่ หากินตามริมลำห้วย เพื่อจับกบ เขียด ขนาดเล็กกิน เคยเห็นเลื้อยไล่กบเขียดอยู่หลายครั้ง แต่มักจับเหยื่อไม่ค่อยได้

สถานภาพ :

มีประชากรชุกชุมในบริเวณพื้นที่ป่าสะแกราช พบได้ทั่วไปตลอดทั้งปี ช่วงที่พบได้บ่อยที่สุดอยู่ในฤดูฝนราวเดือนพฤษภาคมจนถึงกรกฎาคม



งูสิงบ้าน

(ชื่ออื่น : งูสิงธรรมชาติ, งูเห่าตาลาน, งูสิงคอง)

Indochinese Rat Snake

Ptyas korros (Schlegel, 1837)

Colubridae

Squamata