

งูสามานเกล็ดไต่ตาใหญ่

ลักษณะ : ขนาดวัดจากปลายปากถึงก้น 453–466 มม. หางยาว 170–175 มม. เป็นงูขนาดเล็กที่อาศัยหากินอยู่บนต้นไม้ ลำตัวยาวเรียว หัวแหลม ลูกตาโตกลม หางยาวมาก เกล็ดบนหัวขยายใหญ่และเรียบ เกล็ดลำตัวเป็นสันยาวๆ 15 แถว เกล็ดไต่ท้องกว้าง และมีรอยหยักตรงขอบด้านข้างทั้งสองข้าง

เขตแพร่กระจาย : ลำตัวมีสีเทาออกเขียวและมีลายขีดจางๆ เห็นชัดในช่วงต้นๆ ของลำตัว ไต่ท้องสีจางกว่าหรือสีออกเขียวจาง หัวด้านบนสีออกเข้มกว่าบริเวณหลัง ลี้นสีแดงอ่อนๆ และมีปลายสีดำ
พม่าตอนเหนือ ลาว เวียดนาม และไทย ซึ่งในไทยพบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะเวลาหลังพบในบริเวณทิศตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย

ในเขตพื้นที่ป่าสะแกราช พบค่อนข้างชุกชุมทั้งในป่าดิบแล้งและป่าเต็งรัง ในบริเวณป่าดิบแล้ง มักพบอยู่ริมทางเดินหรือริมถนนในที่โล่ง บางครั้งพบริมลำธาร หรืออ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อน ยังไม่เคยพบในบริเวณป่าปลูก บริเวณที่เคยพบ เช่น เขาหินเพลิงในป่าเต็งรัง และบริเวณเขื่อนบนในป่าดิบแล้ง

ที่อยู่อาศัย : ปกตินอนพาดตัวอยู่ตามพุ่มไม้ริมทาง และในป่าเพ็ก คอยดักรับเหยื่อพวกกิ่งก้านต่าง ๆ และพวกกบเขียดต่าง ๆ ในป่าดิบแล้ง มักซ่อนตัวในพุ่มไม้ริมทาง แต่ในป่าเต็งรัง อาศัยอยู่ในกอหญ้าเพ็ก และตามกิ่งไม้ต่ำๆ ที่ไม่สูงจากยอดหญ้าเพ็กมากนัก

อุปนิสัย : ออกล่าเหยื่อในช่วงกลางวัน เคยพบไล่เหยื่อคือกิ่งก้านขึ้นสูงไปบนต้นไม้ในป่าเต็งรัง และจับกบอ่อง (*Rana nigrovittata*) กินตรงหน้าเขื่อนบน ในป่าดิบแล้ง ในกรณีหลังใช้การค่อยเลื้อยเข้าไปหากบ เข้าไปที่ละนิดแล้วหยุดนิ่ง แลบลิ้นสักรูหนึ่ง แล้วค่อยเลื้อยมุ่งไปหาเหยื่อ จนได้ระยะประมาณ 20 ซม. จากเหยื่อ จึงพุ่งตัวเข้าจับ ระหว่างนี้กบจะร้องเสียงแหลมและดิ้นไปมาอย่างรุนแรง มันจะพยายามงับให้ลิ้นเข้าไปเรื่อยๆ จนถึงตำแหน่งเขี้ยวพิษตรงใต้ลูกตา กบจะค่อยๆ เงียบเสียงลงและดิ้นร่นน้อยลง จะเริ่มกลืนกิน กบตัวหนึ่งขนาด 40 มม. ใช้เวลาในการกลืนเพียง 5 นาที เมื่อกลืนเสร็จจะค่อยเลื้อยกลับไปซุกตัวนอนในกอหญ้างัดเดิม

สถานภาพ : เชื่อว่ามีจำนวนประชากรมากพอสมควรในบริเวณที่ศึกษา เพราะพบได้ทั่วไปตลอดปี



งูสายน่านเกล็ดไต่ตาใหญ่

(ชื่ออื่น : งูลอกเขื่อก)

Mountain Bronzeback

Dendrelaphis subocularis (Boulenger, 1888)

Colubridae

Squamata