

## งูแสหางมาเทา

**ลักษณะ :** ขนาดวัดจากปลายปากถึงก้น 728 มม. หางยาว 315 มม. เป็นงูขนาดปานกลางที่ใช้ชีวิตอยู่บนต้นไม้ ตัวโตและตาโตเห็นชัด ส่วนคอคอดเล็ก ลำตัวยาวเรียวมาก และรูปทรงแบนทางแนวตั้ง หางยาวเรียวมาก หัวมีลักษณะที่สังเกตได้ง่าย โดยที่มีมุมขากรรไกรกางยื่นออกมาเห็นได้ชัด และตาโต มีรูม่านตารูปรีวางตัวในแนวตั้ง เกสึคบนลำตัวเป็นสันชัดเจน เกสึคใต้ท้องเรียบ แต่ขยายใหญ่

ลำตัวมีสีพื้นออกเทาปนน้ำตาล บางตัวสีออกเทามากกว่าในขณะที่บางตัวออกน้ำตาลมากกว่า ทั้งตัวด้านหลังมีลายแถมเลอะๆ รูปทรงไม่แน่นอน กระจ่ายไปทั่วแผ่นหลังจนถึงหาง บนหัวมีลายกระดุมละเอียดกว่าบนส่วนหลัง ใต้ท้องสีออกเหลืองและมีลายกระดุมละเอียดสีเทา อยู่ตามแนวคานข้างลำตัวและใต้หาง

**เขตแพร่กระจาย :** มีเขตแพร่กระจายแคบในบริเวณพม่า เวียดนาม ลาว กัมพูชา และประเทศไทย เชื่อว่าน่าจะมีเขตแพร่กระจายกว้างกว่านี้ หากมีการสำรวจอย่างจริงจังต่อไป

ในเขตป่าสะแกราช ได้พบเพียงครั้งเดียวและเพียงตัวเดียว ในฤดูฝนพบเลื้อยอยู่บนถนนลาดยางที่พาดผ่านป่าเต็งรัง ในเดือนกรกฎาคม 2544 ยังไม่พบในสภาพป่าประเภทอื่นๆ

**ที่อยู่อาศัย :** เคยพบนอนขดตัวอยู่ในเวลากลางวัน ในโพรงไม้หรือในซอกเปลือกไม้ในป่าเต็งรังนอกพื้นที่ศึกษา แต่ไม่เคยพบตัวในเวลากลางวันในป่าสะแกราช เวลากลางคืนจึงพบออกมาเลื้อยอยู่บนถนนลาดยางเพื่อหาเหยื่อ

**อุปนิสัย :** ปกติพบเลื้อยหากินไปตามพุ่มไม้และตามคดงู้าเพ็กในเวลากลางคืนค่อนข้างดึก เวลาราว 21:00 น. ขึ้นไป ซึ่งเป็นเวลาที่อากาศในป่าเต็งรังค่อนข้างเย็นด้วยไอน้ำค้าง ยกเว้นหากมีฝนตกหนักในตอนบ่ายและมีฝนตกพรำๆ ต่อเนื่องไปจนถึงตอนค่ำ จะออกหากินตั้งแต่หัวค่ำ เคยพบในเวลา 19:30 น.

อาหารได้แก่ พวกนกเล็กๆ และกิ้งก่าเกาะนอนอยู่ตามกิ่งไม้และพุ่มใบของพืชในป่าเต็งรัง การจับเหยื่อใช้ปากจับแล้วเอาลำตัวพันรัดให้เหยื่อหมดลมหายใจก่อนที่จะกลืนทางหัวเหยื่อเข้าไปก่อน

**สถานภาพ :** หายากมากในบริเวณพื้นที่ป่าสะแกราช พบเพียงตัวเดียวในป่าเต็งรัง น่าจะมีจำนวนประชากรน้อยมาก



งูแสหางมาเทา  
(ชื่ออื่น : งูกะปิ)

**Grey Cat Snake**

*Boiga ocellata* Kroon, 1973

Colubridae

Squamata