

งูสรอยเหลือง

- ลักษณะ :** ขนาดวัดจากปลายปากถึงก้น 363 มม. หางยาว 75 มม. เป็นงูอาศัยอยู่ตามต้นไม้ มีขนาดปานกลาง หัวแบน ปลายปากมีส่วนคอดเล็กน้อยตรงตำแหน่งหน้าลูกตา ลูกตาโตเห็นได้ชัด เกล็ดบนลำตัวเรียบมี 17 แถว เกล็ดใต้ท้องเรียบ หางยาวปานกลาง และค่อนข้างเรียว
- สีลำตัวออกสีน้ำตาลเทาหรือสีน้ำตาลออกแดง ขึ้นอยู่กับอายุของงู เมื่ออายุมากขึ้นสีจะออกแดงขึ้น หัวและหางสีคล้ำกว่าสีของหลัง ใต้ท้องสีขาวออกเหลือง ซึ่งจะเข้มขึ้นไปทางปลายหาง บริเวณด้านหลังคอมีลายขีดสั้น ๆ สีขาวออกเหลืองหรือเหลืองสด เรียงกันเป็นแถวในรูปบั้ง โดยมียอดแหลมชี้ไปทางด้านปลายหาง ลายรูปบั้งนี้มีความแปรผันสูง บางตัวจะไม่ค่อยชัด มีสีกลมกลืนไปกับสีคล้ำ ๆ ของหัวและหลัง
- เขตแพร่กระจาย :** มีเขตแพร่กระจายกว้างในอินเดีย รวมทั้งในหมู่เกาะอันดามัน และหมู่เกาะ นิโคบาร์ พม่า จีนตอนใต้ ส่องกง ลาว เวียดนาม กัมพูชา ไทย มาเลเซีย เกาะปาเลวัน และอินโดนีเซีย
- ในเขตพื้นที่ป่าสะแกราช ได้พบเพียงตัวเดียวในเดือนมีนาคม 2544 ในบริเวณป่าดิบแล้ง ขณะกำลังเลื้อยอยู่บนถนนอย่างช้า ๆ ในเวลากลางคืน หลังจากมีฝนตกหนักในตอนบ่าย ภูษณิดินน้ำจะพบได้ในป่าเต็งรัง รวมไปถึงบริเวณเขตรอยต่อระหว่างป่าดิบแล้งและป่าเต็งรังอีกด้วย
- ที่อยู่อาศัย :** โดยธรรมชาติอาศัยอยู่ในบริเวณป่าที่ค่อนข้างโปร่ง เช่น ป่าเต็งรังและป่าเบญจ-พรรณแล้ง ไม่ค่อยพบอยู่ในป่าที่หนาทึบ ชุกตัวนอนในเวลากลางวันได้ซอกเปลือกไม้บนลำต้นไม้สูงจากพื้นดินประมาณ 2 ม. ตัวที่มีขนาดเล็กอายุน้อยมักซ่อนตัวในพุ่มพองต้นไม้ ตามซอกของราก รอยแตกของเปลือกไม้ และในโพรงดินไ้ราก
- อุปนิสัย :** ออกหากินทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน ส่วนใหญ่ออกหากินในช่วงหัวค่ำ เวลาประมาณ 19:00–20:00 น. ในวันที่มีฝนตกหนักในตอนบ่ายเคยพบออกหากินในตอนเช้าและตอนเย็น ออกล่าเหยื่อพวกจิ้งจกต่างๆ ตามบ้านเรือน เลื้อยได้ไปตามฝาผนังและหลังคาได้ดี มีโอกาสพบในอาคารได้มากพอๆ กับงูเขียวดอกหมาก
- สถานภาพ :** พบมีประชากรน้อยมาก แต่่น่าจะเป็นการประเมินประชากรต่ำเกินไป เชื่อว่ายังคงมีปริมาณชุกชุมอยู่ในบริเวณพื้นที่ป่าสะแกราช



งูสร้อยเหลือง

Common Wolf Snake

Lycodon capucinus (Boie in Boie, 1827)

Colubridae

Squamata