

รูปปล่องหวายหัวดำ

ลักษณะ : ขนาดวัดจากปลายปากถึงก้น 160 มม. หางยาว 17 มม. เป็นนึ่งพืษหากินบนพื้นดิน หัวกว้างพอๆ กับลำตัว ทำให้มองไม่เห็นส่วนคอ ลำตัวยาวเรียว หางสั้นมากเพียงประมาณ 10% ของความยาวหัวและลำตัว แถวเกล็ดบนลำตัวที่ตรงกึ่งกลาง 13 แถว หัวมีเกล็ดใหญ่ เกล็ดด้านหน้าตา 1 เกล็ด เกล็ดหลังตา 2 เกล็ด เกล็ดริมฝีปากบน 7 เกล็ด โดยมีเกล็ดที่สามและที่สี่ติดกับลูกตา ทั้งเกล็ดบนหลังและเกล็ดใต้ท้องเรียบ เกล็ดทวารมี 2 เกล็ด และเกล็ดใต้หางแยกเป็นสองแถว

ลำตัวสีออกน้ำตาลแดง หัวสีค่อนข้างคล้ำ และตามลำตัวมีลายจุดสีคล้ำ ซึ่งมีทั้งจุดชัดและจุดจางตลอดความยาว โคนหางมีแถบสีดำคาดชัดเจน 1 แถบ และมีอีกแถบขนาดเล็กกว่ามากตรงใกล้ปลายหาง ใต้ท้องตั้งแต่กางไปจนถึงก้นสีออกแดงชมพู ใต้หางสีเทาอมฟ้าและมีจุดสีดำกระจายทั่วไปเกือบหมด

เขตแพร่กระจาย : มีเขตแพร่กระจายแคบในประเทศพม่า ไทย ลาว เวียดนาม กัมพูชา ลงไปถึงตอนเหนือของมาเลเซีย

ในบริเวณพื้นที่ป่าสะแกราช เพิ่งสำรวจพบอีกครั้งหนึ่งในปี 2543 ในเดือนพฤศจิกายน หลังจากมีรายงานพบมามากกว่า 20 ปีมาแล้ว พบอาศัยอยู่ในป่าดิบแล้งริมถนนที่ขึ้นไปสู่สามแยก

ที่อยู่อาศัย : ปกติชอบซุกตัวนอนตามโคนต้นไม้ ในพุ่มของต้นไม้ใหญ่ และในซอกกรอบก้นหินขนาดใหญ่บนพื้นป่า บางครั้งพบซ่อนตัวใต้กองกิ่งไม้ หรือใบไม้สุๆ ตัวที่พบในการศึกษา ซ่อนตัวอยู่ในพุ่มต้นมะค่าโมง ที่ขึ้นอยู่ริมถนนลาดยาง แต่อยู่ด้านหลังต้นซึ่งเป็นเงามืด ไซ้จับชุดลึกลงในดินประมาณ 10 ซม. จึงพบตัวเลื้อยออกมา

อุปนิสัย : จัดเป็นนึ่งที่มีพิษร้ายแรงที่มีอันตรายต่อมนุษย์ได้ แต่ไม่ค่อยกัด และยังมีต่อมพิษขนาดเล็ก มักใช้วิธีการเลื้อยหนี โดยพยายามยกส่วนหางและปลายลำตัวที่มีสีสดใสและสีคล้ำๆ ตัดกันออกขู่นอกจากนี้ยังงอส่วนหางบิดไปมา ทำให้ดูน่ากลัวอีกด้วย

อาหารที่กิน โดยปกติเป็นพวกงูดินแท้ในสกุล *Ramphotyphlops* และสกุล *Typhlops* แต่ตัวที่พบนี้มีท้องว่าง เนื่องจากยังไม่ได้กินเหยื่อ

สถานภาพ : น่าจะจัดเป็นนึ่งชนิดที่หายากในบริเวณพื้นที่ป่าสะแกราช นึ่งชนิดนี้มีจำนวนประชากรในธรรมชาติต่ำอยู่แล้ว และเป็นนึ่งที่คอยควบคุมปริมาณงูขนาดเล็กมิให้เพิ่มจำนวนมากเกินไป



รูปล่องหวายหัวดำ

Small – spotted Coral Snake

Maticora maculiceps (Gunther, 1858)

Elapidae

Squamata