ปาดจิ๋วลายแต้ม

ลักษณะ : ขนาดวัดจากปลายปากถึงก้น 25–38 มม. ขนาดเล็ก ลำตัวเรียวบาง หัวโต ปลายปากตัด แขนสั้นกว่าขามาก ลูกตาโปนออกมาชัดเจน มือมีนิ้วแยกออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มละ 2 นิ้ว กลุ่มด้านนอกมีพังผืดยึด 2 ใน 3 ของความยาวนิ้ว ขามีพังผืดยึดโดยตลอดนิ้วเท้า ผิวหนังดูเรียบ แต่มีปุ่มละเอียดกระจายอยู่บนแผ่นหลัง และรอบ ๆ ก้น

ลำตัวสีออกขาวปนเหลืองอ่อนๆ แขนและขาสีขาวจางกว่าลำตัว บางตัวหลังมีลายปื้นสีคล้ำ รูปร่างคล้ายนาฬิกาทราย บางตัวแทบไม่มีลายสีคล้ำเลย แขนและขามีลายพาดสีคล้ำ ใต้ท้องสีจางๆ ดูใสมองเห็นอวัยวะภายในได้ ใต้ฝ่ามือและฝ่าเท้าสีออกเหลืองส้ม

เขตแพร่กระจาย : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออกเฉียงใต้ของไทยและลาว อาจพบในกัมพูชาอีกด้วย

ในป่าสะแกราชพบเพียงบริเวณเดียวที่อ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนบน พบวางไข่ในปลายฤดูฝน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนธันวาคม

ที่อยู่อาศัย : ในเวลากลางวันเกาะนอนอยู่ในพุ่มใบของต้นไม้ริมอ่างเก็บน้ำ ยกเว้นบางตัวพบอยู่บนต้นไม้ริมน้ำ บางครั้งก็ซุกซ่อนตัวในกองใบไม้แห้งและใต้วัสดุบนพื้นป่า ตอนกลางคืนในฤดูผสมพันธุ์ ตัวผู้จะไปส่งเสียงร้องอยู่บนต้นไม้ยื่นตายริมน้ำ ตัวเมียติดตามไปในตอนค่อนคืน ราว 01:00 น. จับคู่ผสมพันธุ์บนต้นไม้ แล้วก่อฟองสีขาวไว้ตามง่ามไม้ ฟองไข่เหล่านี้จะอยู่เหนือน้ำในอ่าง ซึ่งลูกอ๊อดเมื่อฟักออกมาจะหลุดร่วงลงไปเติบโต

อุปนิสัย : มักปรากฏให้เห็นเฉพาะในเวลากลางคืน ส่งเสียงร้องอยู่ตามง่ามกิ่งไม้ หากถูก รบกวนจะไต่หนีขึ้นสูงไปเรื่อย ๆ ไม่ค่อยจะกระโดดลงมาจากต้นไม้ เมื่อจำเป็นจะกระโดดจากกิ่งหนึ่งไปยังอีกกิ่งหนึ่งที่อยู่ใกล้เคียง หรือไปบนต้นไม้อื่นที่กระโดดถึง

สถานภาพ : พบเฉพาะบริเวณในพื้นที่ศึกษา เชื่อว่าเหลืออยู่เพียงประชากรกลุ่มเดียว เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์หมดไปจากบริเวณมาก หากสภาพแวดล้อมรอบอ่างเก็บน้ำไม่ได้รับการดูแลให้คงสภาพเดิม

ปาดจิ๋วลายแต้ม

Nongkhor Bush Frog

Chirixalus nongkhorensis (Cochran, 1927)

Anura (Salientia)