อึ่งลายเลอะ

ลักษณะ : ขนาดวัดจากปลายปากถึงก้น 21–26 มม. ขนาดเล็ก มีผิวหนังหยาบ ปากมนกลม มีแผ่นหูแต่ซ่อนอยู่ใต้ผิวหนังทำให้มองไม่เห็นจากภายนอก ตัวผู้มักมีแถวตุ่มสีขาวเด่นจากใต้ตาลงไปที่มุมขากรรไกร เป็นลักษณะเด่นของชนิดนี้ ตัวเมียมีแถวตุ่มนี้ไม่ค่อยชัด ปลายนิ้วแผ่ออกเป็นแผ่นกลม ซึ่งมีรอยเว้าอยู่ด้านบนตรงกลาง นิ้วเท้ามีพังผืดยึดประมาณ 1 ใน 3 ของความยาวนิ้ว

แผ่นหลังสีออกน้ำตาลคล้ำ จนถึงน้ำตาลอ่อนออกเหลือง มีลวดลายสีดำกระจายไปทั่วไม่เป็นรูปทรงที่แน่นอน บางครั้งมีขอบเป็นสีขาว ใต้ท้องสีออกขาวหรือเหลืองอ่อน ตัวผู้ใต้คางมีสีคล้ำ แขนและขามักมีลายขวางชัดหรือไม่ชัด

เขตแพร่กระจาย : มีการกระจายไม่กว้างขวางนัก พบในพม่าตอนใต้ เกาะไหหลำ เวียดนาม ลาว กัมพูชา ไทย ลงไปถึงคาบสมุทรมลายู

ในป่าสะแกราช พบเพียงครั้งเดียว 4–5 ตัว ในป่าดิบแล้ง ในเดือนพฤศจิกายน 2543 บริเวณใกล้เขื่อนบน พบตัวลูกอ๊อดอยู่ในแอ่งน้ำเหนือเขื่อน

ที่อยู่อาศัย : โดยทั่วไปอยู่ตามชั้นใบไม้ผุบนพื้นป่าดิบแล้ง และป่ารกๆ ริมลำห้วย ในป่าเต็งรังพบเพียงไม่กี่ตัว ซ่อนอยู่ใต้ขอนไม้และกองใบไม้ผุ บริเวณทางลงสู่เขื่อนบนใกล้สามแยก บางส่วนอยู่ริมถนนที่ต่อไปจากสามแยก ลึกเข้าไปในป่าดิบแล้ง

อุปนิสัย : มักพบออกมาจับคู่ผสมพันธุ์ในราวต้นฤดูฝนในป่าที่มีความชื้นสูงหรือในทุ่งหญ้าที่มีป่าสมบูรณ์อยู่โดยรอบ ประชากรอึ่งชนิดนี้ในบริเวณป่าสะแกราชมีจำนวนน้อยมาก และที่พบมักเป็นอึ่งวัยรุ่นที่ยังโตไม่เต็มที่

แหล่งที่หากินน่าจะเป็นตามพื้นป่าชื้นๆ ในร่องทางน้ำไหลและริมลำห้วย กินแมลงขนาดเล็กเป็นอาหาร เสียงร้องดังกว่าเสียงร้องของอึ่งชนิดอื่นๆ ที่พบอยู่ด้วยกัน ฟังคล้ายแผดเสียงเพียงเสียงเดียว

สถานภาพ : หายากมากในบริเวณป่าสะแกราช อาจเนื่องจากความชื้นบนพื้นป่ามีน้อยเกินไป ไม่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิต เพราะพบชุกชุมมากในป่าดิบชื้นภาคใต้และตะวันออกเฉียงใต้

อึ่งลายเลอะ

(ชื่ออื่น : อึ่งลายแต้ม)

Noisy Chorus Frog

Microhyla butleri Boulenger, 1900

Anura (Salientia)