

นกแอ่นฟ้าหงอน

ลักษณะ : นกขนาดเล็ก ลำตัวยาว 23 ซม. รูปร่างคล้ายนกแอ่น แต่มีสีสดใสกว่า มีหงอนยาวตรงหน้าผากเป็นจุดเด่น ลำตัวด้านหลังสีเทาอมฟ้า ปีกสีเทาเข้มกว่าลำตัว ออกสีเทาอมฟ้าจาง ๆ ส่วนท้องตอนล่างและขนคลุมใต้โคนหางสีขาว ปีกแคบยาวและปลายแหลม เวลาเกาะพักปลายปีกจะไขว้กัน ขนหางยาวและแยกเป็นแฉกเล็กมาก ปลายแหลมคล้ายเข็ม เวลาเกาะพัก ขนหางจะยาวเลยขนปลายปีกออกไปอย่างเห็นได้ชัด ตัวผู้มีแถบสีน้ำตาลแดงที่แก้ม นกที่ยังโตไม่เต็มวัย มีลายคล้ายเกล็ดบนลำตัว และมีแต้มจุดขาวบนปีกและหาง

เขตแพร่กระจาย : อินเดีย จีนด้านตะวันตกเฉียงใต้ เมียนมาร์ ไทย กัมพูชา ลาว และเวียดนาม

ที่อยู่อาศัย : หุบโล่ง ป่าเต็งรัง ป่าละเมาะ พื้นที่เกษตรกรรม จากที่ราบไปจนถึงระดับความสูง 1400 ม. ในป่าสะแกราช พบบริเวณป่าเต็งรังและป่าปลูก

อุปนิสัย : มักพบเป็นฝูงเล็ก 6-8 ตัว บินออกหากินเวลาเช้าตรู่และในเวลายืนจวนพลบ ตอนกลางวันแดดร้อนจัดมักเกาะพักผอบนยอดไม้สูง บินออกหากินกลางอากาศเหนือระดับยอดไม้ไม่มากนัก มีความสามารถในการบินสูง กระพือปีกรวดเร็วมาก สลับกับการกางปีกออกไปในท้องฟ้าอย่างคล่องแคล่วรวดเร็ว อาหารได้แก่แมลงต่าง ๆ ที่บินอยู่กลางอากาศ ส่วนมากจะเป็นแมลงวัน (flies) ต่าง ๆ ตัวมวน มดมีปีก ผีเสื้อ และต่อ มันจะบินเข้าไปจับแมลงที่บินอยู่นั้นทันที แล้วกลืนกินอย่างรวดเร็ว เนื่องจากปากของมันอ้าได้กว้างมาก

ผสมพันธุ์ราวเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม รังมีขนาดเล็กเป็นรูปถ้วยครึ่งซีก รังทำด้วยเปลือกไม้ ขนนก เชื่อมติดกันด้วยน้ำลายเหนียว ๆ ของมัน รังของมันมักจะอยู่ติดกับกิ่งไม้เกลี้ยง ๆ ในแนวอนและอยู่สูงจากพื้นดิน 4 – 18 ม. วางไข่ครั้งละ 1 ฟอง ไข่จะโตเต็มรังพอดี และติดแน่นอยู่กับรังด้วยน้ำลายเหนียว ๆ ของนก พ่อแม่ผลัดกันกกไข่

สถานภาพ : เป็นนกประจำถิ่น พบไม่บ่อยในป่าสะแกราช

กฎหมายจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง



นกแอ่นฟ้าหงอน

Crested Treeswift

Hemiprocne coronata (Tickell, 1833)

Hemiprocnidae

Apodiformes