

นกขี้เถ้าใหญ่

- ลักษณะ :** ขนาดความยาวลำตัว 30 ซม. ตัวผู้มีขนาดใหญ่ สีเทา หน้ามีลายพาดสีดำ ออกสีเทา ใต้ท้องและขนคลุมใต้โคนหางมีสีขาว ตัวเมียหน้ามีลายพาดสีดำจางกว่าตัวผู้ มักมีลายขีดที่ท้อง ลูกนกที่ยังโตไม่เต็มวัย มีสีน้ำตาลคล้ายคลึงตัวเมีย แต่มักมีลายขีดที่อก ท้อง และขนคลุมใต้โคนหาง
- เขตแพร่กระจาย :** อินเดีย จีนตอนใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เกาะไหหลำ หมู่เกาะอันดามัน เกาะชวา
- ที่อยู่อาศัย :** ป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้งที่ค่อนข้างโปร่ง ท่งโล่ง จากพื้นราบจนถึงระดับความสูง 1,800 ม. ในป่าสะแกราช พบย่อยบริเวณป่าเต็งรัง นอกจากนั้นยังพบในป่าดิบแล้ง ป่าปลูก และบริเวณทุ่งหญ้าผสมป่าเต็งรัง
- อุปนิสัย :** พบเป็นคู่หรือฝูงเล็ก ๆ 5-6 ตัว เกาะตามยอดไม้หรือกิ่งไม้ ระดับที่ค่อนข้างสูงอาหารส่วนใหญ่ได้แก่ แมลง โดยจิกกินตามยอดไม้หรือกิ่งไม้ หรืออาจโฉบจับกลางอากาศ และกินผลไม้บางชนิด โดยเฉพาะลูกไทร ผสมพันธุ์ช่วงเดือนมีนาคม-มิถุนายน ทำรังตามง่ามไม้ในระดับสูง รังเป็นรูปถ้วยหยาบ ๆ วางไข่ครั้งละ 2-3 ฟอง ไข่มีสีเหลือง หรือสีเขียวอ่อน มีลายสีน้ำตาลกระจายทั่วฟอง ระยะฟักไข่ 14-15 วัน
- สถานภาพ :** เป็นนกประจำถิ่น พบย่อยในป่าสะแกราช



นกขี้เถ้าใหญ่

Large Cuckoo-shrike

Coracina macei (Lesson, 1831)

Campephagidae

Passeriformes