

นกปรอดหัวสีเขม่า

- ลักษณะ :** ขนาดลำตัวยาว 20 ซม. มีหงอนสีดำสั้น หน้าและกระหม่อมสีดำ ตัดกับแก้มสีเทา ลำตัวด้านบนสีน้ำตาล ตะโพกสีขาว ปลายหางสีขาว ด้านล่างของลำตัวสีเทาจาง ๆ โคนหางด้านล่างมีทั้งสีเหลือง และสีแดง ชนิดย่อยที่พบในป่าสะแกราช โคนหางด้านล่างมีสีเหลือง
- เขตแพร่กระจาย :** จีนตอนใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เกาะบาหลี และเกาะชวา
- ที่อยู่อาศัย :** พบตามป่าโปร่ง ทุ่งหญ้า พื้นที่เกษตรกรรม จากที่ราบไปจนถึงระดับความสูง 1800 ม. ในพื้นที่ป่าสะแกราชพบมากในป่าเต็งรัง นอกจากนี้ยังพบในป่าดิบแล้ง ป่ารอยต่อระหว่างป่าดิบแล้งและป่าเต็งรัง ป่าปลูก และบริเวณทุ่งหญ้าผสมป่าเต็งรัง
- อุปนิสัย :** พบหากินเป็นฝูง ปกติหากินบนต้นไม้ บางครั้งลงมายังพื้นดิน อาหาร ได้แก่ ผลไม้ ตัวหนอน แมลง ผลไม้ขนาดเล็ก เช่น ไทร หว้า ตะขบ จะใช้ปากเด็ดจากขั้ว แล้วกลืนกินทั้งผล ถ้าเป็นผลไม้ขนาดใหญ่ เช่น ชมพู มะละกอ มะม่วง จะใช้ปากจิกกินทีละน้อย จิกกินแมลงและตัวหนอน ตามกิ่ง ลำต้น ยอดไม้ และบนพื้นดิน
- ผสมพันธุ์ระหว่างเดือนมีนาคม ถึงเดือนมิถุนายน ทำรังเป็นรูปถ้วยอยู่ตามกิ่งไม้ของไม้ต้น ไม้พุ่ม หรือกอไผ่ วางไข่ครั้งละ 2 – 3 ฟอง ไข่สีขาวแกมชมพู มีจุดลายสีน้ำตาลแกมม่วงทั่วฟอง ทั้งพ่อแม่ช่วยกันทำรัง ฟักไข่ และเลี้ยงดูลูกอ่อน ระยะฟักไข่ 14 วัน
- สถานภาพ :** เป็นนกประจำถิ่น พบบ่อยมากในป่าสะแกราช ชนิดย่อยที่พบในป่าสะแกราชเป็นชนิดย่อย *thais* มีสีเหลืองที่โคนหางด้านล่าง ซึ่งจะพบทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ
- กฎหมายจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง



นกปรอดหัวสีเข้ม

Sooty-headed Bulbul

Pycnonotus aurigaster (Vieillot, 1818)

Pycnonotidae

Passeriformes