

นกขมิ้นท้ายทอยดำ

- ลักษณะ :** ลำตัวยาว 27 ซม. สีตัวส่วนใหญ่เป็นสีเหลืองสดใส มีแถบหน้าสี
ดำคาดจากโคนปากไปจรดกันที่ท้ายทอย ปีกและหางบางส่วน
เป็นสีดำ ปากแหลมแข็งแรงสีส้ม นกตัวเมียสีไม่เหลืองสดใส
เหมือนนกตัวผู้ แต่จะเป็นสีเหลืองอมเขียว นกวัยอ่อนมีลายขีดสี
ดำบริเวณท้อง
- เขตแพร่กระจาย :** เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อินเดีย หมู่เกาะอันดามัน หมู่เกาะนิโคบาร์ จีน
ไต้หวัน ใต้หวัน หมู่เกาะซุนดา ซูลาเวซี และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
- ที่อยู่อาศัย :** ป่าดิบแล้ง ป่าเต็งรัง ป่าร่วน สวนผลไม้
- อุปนิสัย :** พบเดี่ยว ๆ เกาะอยู่บนต้นไม้ บินขึ้น ๆ ลง ๆ เป็นลูกคลื่น กิน
แมลง ผลไม้สุก และน้ำหวานดอกไม้ ผสมพันธุ์ในช่วงฤดูร้อน
วางไข่ครั้งละ 2-4 ฟอง ใช้เวลาฟักไข่ประมาณ 14 วัน
- สถานภาพ :** นกอพยพ คาดว่ามีนกส่วนหนึ่งมีการผสมพันธุ์ในประเทศไทย
พบบ่อย



นกขมิ้นท้ายทอยดำ

Black-naped Oriole

Oriolus chinensis (Linnaeus, 1766)

Oriolidae

Passeriformes