

นกเขี้ยวคราม

- ลักษณะ :** ลำตัวยาว 25 ซม. นกตัวผู้และนกตัวเมียมีสีขนแตกต่างกันเห็นได้ชัด ตัวผู้ส่วนบนของลำตัว ตั้งแต่กระหม่อม ท้ายทอย หลังคอ หลังไหล่ ตะโพก จนถึงขนคลุมบนโคนหาง รวมทั้งขนคลุมใต้โคนหางด้วยเป็นสีฟ้าครามสดใส หน้าผากมีขนสีดำคล้ายกำมะหยี่ ส่วนล่างของลำตัวที่เหลือทั้งหมดเป็นสีดำสนิท ขนปีกและขนหางก็มีสีดำ จะงอยปากสีดำ ขาและนิ้วสีดำ ม่านตาสีแดงเข้ม นกตัวเมียและตัวที่ยังไม่โตเต็มวัย มีขนทั่วทั้งตัวเป็นสีฟ้าอมเขียวหม่น ๆ ยกเว้นขนปลายปีก(primaries) ขนกลางปีกด้านนอกและขนหางเส้นนอก ๆ เป็นสีดำ
- เขตแพร่กระจาย :** พบในอินเดีย ศรีลังกา และอันดามัน จีนด้านตะวันตกเฉียงใต้ หมู่เกาะซุนดา ฟิลิปปินส์ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
- ที่อยู่อาศัย :** พบในป่าดิบชื้น ป่าดิบแล้ง ตั้งแต่พื้นราบจนถึงความสูงระดับ 1,500 ม. ในป่าสะแก ราชสวนใหญ่พบบริเวณป่าดิบแล้ง
- อุปนิสัย :** นกชนิดนี้ชอบอาศัยและหากินอยู่บนยอดไม้สูง ซึ่งมีใบหนาทึบ มักพบบินและกระโดด จิกกินลูกไม้บนต้นไม้สูง ๆ ส่วนมากพบอยู่ด้วยกันเป็นคู่ บางที่รวมกันเป็นฝูงเล็ก ๆ บนต้นไม้ที่มีผลสุก โดยเฉพาะต้นไทร ซึ่งถือเป็นอาหารหลัก นอกจากผลไม้สุกแล้ว ยังชอบจิกกินแมลงตามต้นไม้และน้ำหวานจากดอกไม้
- ผสมพันธุ์และทำรังวางไข่ในฤดูร้อน ราวเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม รังมักทำไว้บนยอดไม้สูงที่มีพุ่มใบหนา ทำด้วยหญ้าและกิ่งไม้สานกันเป็นรูปถ้วยหยาบ ๆ ตัวเมียทำหน้าที่สร้างรังและกกไข่แต่เพียงผู้เดียว วางไข่ครั้งละ 2 ฟอง ระยะเวลาไข่ประมาณ 13 วัน
- สถานภาพ :** เป็นนกประจำถิ่นที่พบได้บ่อย ในป่าสะแกราชพบไม่ชุกชุม
- กฎหมายจัดนกเขี้ยวครามเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง



นกเขี้ยวคราม

Asian Fairy-bluebird, Fairy-bluebird

Irena puella (Latham, 1790)

Irenidae

Passeriformes