

## นกจับแมลงจุกดำ

- ลักษณะ :** ลำตัวยาว 17 ซม. นกตัวผู้มีสีตัวส่วนใหญ่เป็นสีฟ้าสด ยกเว้นหย่อมสีดำเล็ก ๆ ที่ท้ายทอย และแถบสีดำใต้คอ ท้องสีขาว นกตัวเมียคล้ายนกตัวผู้ แต่สีซีดจางกว่าและไม่มีจุกสีดำที่ท้ายทอย และแถบสีดำที่คอ
- เขตแพร่กระจาย :** จากอินเดียมายังตอนใต้ของจีน ไทหูล่า ไต้หวัน หมู่เกาะซุนดา ฟิลิปปินส์ หมู่เกาะอันดามัน หมู่เกาะนิโคบาร์ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
- ที่อยู่อาศัย :** ป่าดิบแล้ง ป่าเต็งรัง ป่าร่วน ป่าไผ่ ในป่าสะแกราช พบได้ทั้งในป่าเต็งรังและป่าดิบแล้ง
- อุปนิสัย :** หากินเดี่ยว ๆ ชอบหลบซ่อนตัวและหากินแมลงอยู่ในระดับกลางและระดับล่างของต้นไม้ที่มีใบร่มครึ้ม กระโดดหากินไปตามกิ่งไม้ ไม่ชอบบินไกล ๆ ผสมพันธุ์ระหว่างเดือนมิถุนายน-สิงหาคม วางไข่ครั้งละ 3-4 ฟอง
- สถานภาพ :** นกประจำถิ่น พบน้อย มีนกอพยพเข้ามาบ้าง พบไม่บ่อยในป่าสะแกราช  
กฎหมายยังไม่จัดเป็นสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครอง



นกจับแมลงจุกดำ

**Black-naped Monarch**

*Hypothymis azurea* (Boddaert, 1783)

Monarchidae

Passeriformes