

นกอีเสือหลังแดง

- ลักษณะ :** เป็นนกขนาดกลาง ลำตัวยาว 20 ซม. หัวค่อนข้างโต ปากจุกม้วน หางยาว ขนด้านหลังสีน้ำตาลแดง ส่วนกระหม่อม ท้ายทอย และแผ่นหลังส่วนบนมีสีเทา มีแถบสีดำคาดตา ปีกสีน้ำตาลแดง มีแถบสีขาวเล็ก ๆ บริเวณโคนขนปลายปีก จะเห็นได้ชัดขณะบินได้ท้องสีน้ำตาลอ่อนเกือบขาว หางยาวสีดำและขนหางด้านนอกสีขาว ตัวผู้บริเวณหน้าผากมีสีดำ ส่วนตัวเมียหัวมีสีเทา บริเวณหัวตามีสีขาว ปีกและหลังมีสีน้ำตาลแดงจางกว่า นกที่ยังโตไม่เต็มวัยด้านหลังมีลายขีดสีดำ
- ที่อยู่อาศัย :** ป่าเต็งรัง ป่าละเมาะ ป่าโปร่ง ทุ่งโล่ง ทุ่งนา และพื้นที่เกษตรกรรม ในป่าสะแกราช พบบริเวณที่โล่ง ทุ่งหญ้าผสมป่าเต็งรัง
- เขตแพร่กระจาย :** พบในรัฐอุสสัสม์ จีนตอนใต้ เมียนมาร์ ไทย ลาว กัมพูชาและเวียดนาม
- อุปนิสัย :** เป็นนกที่อพยพเข้ามาในบริเวณป่าสะแกราชต้นฤดูหนาว พบหากินตามลำพัง เกาะกิ่งไม้และยอดพุ่มไม้ในที่โล่ง กินแมลงและสัตว์ขนาดเล็ก เช่น กบ เขียด สัตว์เลื้อยคลาน เป็นอาหาร ด้วยการโฉบจับตามพื้นดิน ทำรังเป็นรูปถ้วยตามพุ่มไม้หรือตามต้นไม้ขนาดเล็ก
- สถานภาพ :** เป็นทั้งนกประจำถิ่นและนกอพยพมาช่วงนอกฤดูผสมพันธุ์ พวกที่เป็นนกอพยพพบบ่อยและปริมาณปานกลาง พบทางภาคเหนือ ภาคตะวันตก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนพวกที่เป็นนกประจำถิ่นพบไม่บ่อย และปริมาณไม่มากนัก พบเฉพาะในบางท้องที่ เช่น ทางภาคเหนือ และภาคตะวันตก ในป่าสะแกราช พบบ่อยเฉพาะบริเวณที่โล่งทุ่งหญ้าผสมป่าเต็งรังในช่วงฤดูนกอพยพ
- กฎหมายจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง



นกอีเสือหลังแดง

Burmese Shrike

Lanius collurio Lesson, 1834.

Laniidae

Passeriformes